

遊戲化反毒宣導系列活動企劃書

一、計畫緣起

國泰人壽自 106 學年度始承保學生團體保險，守護學子人身安全，亦與教育部國教署合作「永續校園計畫」，將「反毒宣導」、「環境教育」、「校園安全」及「風險管理與理財知識」等議題帶入校園，期待學子健康成長。自 108 學年起反毒議題將以「遊戲化反毒宣導」作為主軸，藉企業及基金會資源發揮影響力。

二、計畫目標

透過遊戲化之宣導方式，幫助學子由「識毒」發展「拒毒」能力。

三、辦理單位

1. 指導單位：(待確認)
2. 主辦單位：國泰人壽慈善基金會、國泰人壽保險股份有限公司
3. 協辦單位：英屬維京群島幫你優股份有限公司

四、計畫內容

1. 活動一：於數位學習平台 PaGamO 之「國中小世界」置入反毒知能線上測驗題庫^註及任務，供學生進行線上學習。
註：測驗題庫內之 440 題題目，乃委由國立台灣師範大學健康促進與衛生教育學系及國立中正大學犯罪防治學系開發編撰，已於 108 年 9 月 23 日進行審查會議。參考審查委員建議後修正之反毒測驗題目詳見附件一、二。
(1)參與對象：全台灣中小學生
(2)參與方式：學生自主登入數位學習平台 PaGamO 即可在遊戲過程中吸收反毒知識。
2. 活動二：國泰慈善基金會志工進入校園，以班級為單位舉辦實體反毒小規模電競，反覆練習反毒題目。
(1)參與對象：全台灣中小學生
(2)參與方式：由國泰人壽慈善基金會進入學校，協助學生登入 PaGamO，進行反毒小規模電競。

五、計畫時程

自 108 學年度開始實施。

六、經費來源

國泰人壽保險股份有限公司。

七、本計畫由教育部國教署、國泰人壽慈善基金會及國泰人壽保險股份有限公司共同制定，核定後實施，修正時亦同。

附件一、國小反毒題庫

選擇題										
編號	難度	題目	多媒體檔名	選項A	選項B	選項C	選項D	正確答案	詳解	詳解多媒體檔名
1	中	以下關於施用毒品的說法，何者正確？		只使用一次毒品並不會對身體健康造成危害	如果意志力堅強，偶爾使用毒品不會對毒品成癮	持有第一級毒品，沒有施用、運輸或販賣也會構成犯罪	毒品成癮後，很容易就可以戒除	C	毒品容易使人上癮，即使出於好奇心施用毒品，或是在他人的誘惑下，也會忍不住再次施用。施用毒品成癮的人，要真正完全戒除毒癮難度不小。依毒品危害防制條例第十一條，持有第一級毒品便會構成犯罪。	
2	易	現今許多毒品透過餅乾、巧克力、咖啡包等方式包裝，藉此吸引學生的好奇心，以下哪些情形可能為包裝所與毒品的陷阱？		有拆封痕跡的包裝	山寨品牌的包裝	自創卡通圖案或特殊造型的包裝	以上皆是	D	https://reurl.cc/DGxE5	
3	中	有關於毒品，哪一項說明是「錯誤」的？		大多數的毒品是可以用來治病的藥物	毒品是具有成癮性、濫用性及社會危害性的麻醉藥品	根據毒品危害防制條例，毒品可被分為四級	根據毒品危害防制條例，以第四級毒品的成癮性及社會危害性最大	D	大多數的毒品是可以用來治病的藥物，若非醫療目的且無醫師指示，而過量的使用藥物，造成對身心健康的傷害，甚至影響社會秩序，就是藥物濫用。管制藥物濫用過於嚴重，則會被列為毒品。根據毒品危害防制條例，以第一級毒品的成癮性及社會危害性最大。	
4	難	下列何種毒品具有抑制食慾功能，時常被用於非法的減肥藥中，讓使用減肥藥的人在不自覺中成癮？		愾他命(K他命)	安非他命	FM2	搖頭丸	B	安非他命具有讓人比較吃不下東西的功能，常被加入非法的減肥藥中，讓使用減肥藥的人誤以為可以有效的減肥，而在不自覺中成癮，進而可能引起安非他命的副作用。	
5	中	在學校的某一角落，發現含有白色粉末的夾鏈袋及吸食器，周遭傳來塑膠燃燒的味道，請問有可能是下列何種毒品？		愾他命(K他命)	安非他命	搖頭丸	嗎啡	A	施用愾他命(K他命)時，會傳出塑膠燃燒的味道。	
6	難	小強假日和同學一起打球，卻將水壺放在自己的視野外，喝水後不久感到意識模糊，便不省人事的睡著，請問小強的水壺中有可能被加入什麼藥物？		嗎啡	愾他命(K他命)	安非他命	FM2	D	FM2為強力安眠藥，且安眠作用快速，FM2溶入水中無色無味，因此常被不法人士用來昏迷他人，應盡量避免水或飲料離開自己的視線範圍內，以確保自身的安全，如果不小心喝到含有FM2的水，應盡快離開現場並求救。	
7	中	下列哪些情況是施用毒品後所造成的影響？(複選)		對人體身心健康產生危害，甚至對生命產生威脅	為了有錢購買毒品，犯下偷竊、搶劫、販毒等案件	與他人建立良好人際關係	影響學習與工作的生活	A&B&D	施用毒品會產生生理及心理上的副作用，過量使用會導致生命危險。施用毒品者會產生成癮的效果，用藥量會逐漸增加，因此需要更多的金錢購買毒品，以滿足自己的需求。施用毒品也會造成人際的疏離，其精神狀況也會影響工作和學業的表現。	
8	難	小星長期使用某種毒品時，開始有幻聽，聽到有人跟他說話，他的血管裡面有很多的蟲在蠕動，小星試圖想看看自己的血管內有沒有蟲，請問小星有可能是使用什麼毒品？		海洛英	安非他命	愾他命(K他命)	一粒眠	B	安非他命所產生的影響，長期使用安非他命可能會造成精神分裂症，症狀包括猜忌、胡思亂想、幻覺、強迫或重複性的行為、睡眠障礙等等。	

9	易	以下各種檢驗方式中，哪一種檢驗方式可以做為檢驗是否使用毒品方法？		尿液檢驗	毛髮檢驗	血液檢驗	以上皆是	D	尿液、毛髮及血液是目前常見的檢驗方式，其中以尿液檢驗最常見。	
10	易	小國最近心情不好，隔壁的同學介紹他快樂丸，並告訴他吃完快樂丸之後，會感到很快樂，請問小國應該怎麼做？		為了眼前的快樂，毫不遲疑地吃下去	拒絕同學的介紹，並告訴老師	因為是同學介紹的快樂丸，所以吃了也不會有問題	向同學多要幾顆，以後心情不好可以吃	B	快樂丸是搖頭丸的俗稱，使用後會感到愉悅及活動力亢進，產生其他的副作用，例如：心情不安、胡思亂想，吃不下飯等等。	
11	中	如果發現親朋好友有吸毒的情形，可以透過哪些方式幫助他們？(複選)		撥打戒毒成功專線	吸毒不會影響家庭及社會，所以不需要幫助他們也沒關係	找各縣市毒品危害防治中心的協助	透過毒癮戒治收容機構收容戒毒	A&C&D	吸毒會帶來家庭關係破裂及社會治安不好的問題，可以透過撥打戒毒成功專線 (0800-770-885)、各縣市毒品危害防治中心或毒癮戒治收容機構的收容戒毒，所提供的諮詢服務及就學、就業等資源，幫助吸毒的人戒除毒癮。	
12	易	在學校或是住家附近，發現有人有施用、販賣毒品的行為，可以如何解決，使自己所居住的環境更安全、健康？		威脅他並向他索取好處	施用毒品只會對自己造成危害，並不會影響社會治安	假裝沒看到，就沒事了	撥打110，通報警察	D	施用、販賣毒品除了影響個人的身心健康，也會影響家庭及社會，因此如果在學校或是住家附近，發現有人有施用、販賣毒品的行為，可以撥打110，通報警察，使自己所居住的環境更安全。	
13	難	下列有關新興毒品的敘述，何者「錯誤」？		混合多種不同比例的毒品	主要混合新興中樞神經物質，如：合成卡西酮、合成大麻	使用新興毒品的毒性比較低、危險性也比較低	包裝成咖啡包、糖果餅乾等形式	C	新興毒品混合多種不同比例的藥物，成分複雜且有些藥物的特性互相衝突，可能導致更高的毒性，甚至過量而致命。	
14	中	施用毒品會對身體健康造成哪些影響？(複選)		提振精神，有助於集中注意力	身體器官病變	共用針頭感染愛滋病	懷孕中婦女施用毒品，會生出有毒癮的寶寶	B&C&D	使用興奮劑之初會感到提神、興奮，但是等到藥效減低後，會感到疲倦、無力，並無法提振精神或集中注意力。	
15	難	小花在參加舞會的時候，吃了一包朋友給他的「糖果」，在舞廳跳舞不久後，體溫高達43度，送醫院後，發現有橫紋肌溶解、急性腎衰竭等症狀，請問那一包糖果可能是什麼毒品？		懂他命(K他命)	搖頭丸	FM2	大麻	B	過量使用搖頭丸(中樞神經興奮劑)會產生中毒症狀，導致體溫高達43度、腎衰竭等症狀，甚至有死亡的風險。	
16	易	影片中提到許多出國應該注意的事情，下列什麼情形是不能做的？(複選)	https://www.youtube.com/watch?v=SqpYc6GCp6w	不攜帶毒品出國	收取別人的金錢，幫忙走私毒品	幫陌生人拿行李進出國	不要隨意碰觸他人的行李	B&C	曾經多次發生，有運毒人士假借旅客的善心，請旅客幫忙提行李，導致旅客被竄獲行李箱裡藏有毒品，而移送法辦，所以應該注意並委婉拒絕陌生人的請求。	

17	中	佑哥找喬喬幫他保管一包安非他命，並對喬喬說：「寄放一下而已，不會違法的。」喬喬心想佑哥平常很照顧他，就答應幫忙保管。下列哪個說明是正確的？		幫忙保管毒品是不會違法的	只要沒有使用毒品，就不會違法	如果喬喬未滿18歲，就不會被依毒品危害防制條例處罰	幫忙保管毒品而持有會違反毒品危害防制條例而遭處罰	D	喬喬幫忙保管毒品的行為，就是毒品危害防制條例中規定的持有毒品，根據第十一條規定，「持有第二級毒品者，處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣三萬元以下罰金。」因此，持有毒品的行為會違反毒品危害防制條例的規定，即使喬喬未滿18歲，也會依少年事件處理法的規定處理。	
18	中	如果朋友拿出一包來路不明的糖果要請你吃，你應該怎麼辦？(複選)		開心的和他一起吃	委婉的拒絕他	拿給老師檢查有沒有問題	等拿回家讓家人確認沒問題之後再吃	B&C&D	因為不確定糖果是從哪裡來的，裡面裝的是不是真的糖果也不確定，所以最好先經過老師或家人的檢查，確認沒問題後再吃如果怕傷害彼此間的感情也可以委婉的拒絕同學的好意，例如：謝謝你，但是我現在不餓。	
19	易	如果發現親友有藥物濫用的狀況，可以撥打以下哪個專線呢？		0800-770855(請請你幫幫我)	0800-768-995(請幫幫我求救)	0800-013-999	0800-231-161	A	容易混淆的選項C為自殺防治專線的號碼，B為內政部男性關懷專線，戒癮成功專線的號碼是選項A(請請你幫幫我)。	
20	易	小明在路上遇到一個人，那個人告訴小明只要幫忙把一包東西帶到一個地方並交給那裡的人，便會給他500塊零用錢。如果你是小明，你應該怎麼做？		助人為快樂之本，所以決定幫忙對方	為了零用錢而答應幫忙對方	找藉口拒絕並盡快離開	對方看起來不是壞人，幫他一個忙應該沒有關係	C	用零用錢吸引學生，引誘他們幫忙轉交毒品是販毒集團的慣用手法，萬一遇到這種情形一定要特別注意，《毒品危害防制條例》的第4條也明文規定了運輸各級毒品的處罰，就算是幫忙運送毒品也是會被處罰的，有刑事法律責任！	
21	難	在《毒品危害防制條例》的規定裡面，懂他命(K他命)是屬於第幾級毒品？		第一級	第二級	第三級	第四級	C	《毒品危害防制條例》裡面將毒品依成癮性(會愈用愈多，否則達不到相同效果)、社會危害性(毒品會引發的社會犯罪問題嚴重度)及濫用性(將毒品分為四級，懂他命(K他命)屬於其中的第三級。	
22	中	在一場派對上，為了炒熱氣氛，你的朋友便拿出毒品炫耀，請問朋友的行為是否違法？		否，只是拿出來讓大家看而已又沒有真的用了	否，朋友只是為了讓參加派對的大眾盡興而已	是，因為把毒品拿出來之後就一定使用	是，就算只是手中持有毒品也是犯罪	D	《毒品危害防制條例》第11條規定了持有各級毒品的處罰，因此即使只是持有毒品都是屬於犯罪的一種，另外需要特別注意，持有毒品和使用毒品是兩個不同的犯罪，兩者不能混淆。	
23	中	《毒品危害防制條例》裡面所規定需負法律責任的行為有：製造運輸販賣毒品、施用毒品、轉讓毒品、引誘他人施用毒品、強暴脅迫欺騙或非法使人施用毒品、意圖販賣而持有毒品、持有毒品。請問嚴重的是哪一項？		引誘他人施用毒品	意圖販賣而持有毒品	製造運輸販賣毒品	強暴脅迫欺騙或非法使人施用毒品	C	詳解：違反毒品危害防制條例之行為，刑責由輕到重依序為：(一)持有毒品、(二)施用毒品、(三)轉讓毒品、(四)引誘他人施用毒品、(五)強暴脅迫欺騙或非法使人施用毒品、(六)意圖販賣而持有毒品、(七)製造運輸販賣毒品。其中製造運輸販賣毒品最重可能被判死刑或無期徒刑，最輕也會被判五年以上的有期徒刑。就像影片內提到的，毒品最主要的吸食方式是用舌頭舔，之所以用這個方式是因為毒藥的藥物成分在於背面混合了藥物和糯米膠的塗料(就像是一般郵票背面乾掉的膠水)，另外最近也出現了發狠用糯米紙製成的毒藥，將它含在嘴巴不僅可以吸食到毒品，糯米紙也會融於口中不易留下證據。	
24	中	請問毒郵票的吸食方式是什麼？	https://www.youtube.com/watch?v=PHNq8YBPpY	吸食燃燒之後產生的煙霧	把毒郵票泡在水裡之後再喝下去	用針頭進行注射	用舌的或含在嘴巴中使用	D	就像影片內提到的，毒品最主要的吸食方式是用舌頭舔，之所以用這個方式是因為毒藥的藥物成分在於背面混合了藥物和糯米膠的塗料(就像是一般郵票背面乾掉的膠水)，另外最近也出現了發狠用糯米紙製成的毒藥，將它含在嘴巴不僅可以吸食到毒品，糯米紙也會融於口中不易留下證據。	

25	難	請問影片中的衣服和牛仔褲分別代表什麼毒品？	https://www.youtube.com/watch?v=p8eVxFEgo1o	K他命、搖頭丸	搖頭丸、K他命	安非他命、古柯鹼	古柯鹼、安非他命	B	通常從事毒品相關犯罪的人為了躲避警署的追捕，在犯罪過程中會盡量使用其他代號來代替直接說出毒品名稱，這些代號又被稱為「黑話」。搖頭丸除了衣服以外也會被稱為亞當、綠蝴蝶；K他命除了褲子又被稱為：卡門、K仔。	
26	易	下列哪些是吸毒的人外觀會出現的特徵？	https://www.youtube.com/watch?v=TaKR3JFIMJY	走路不穩、搖搖晃晃	眼睛下面有很重的黑眼圈	目光呆滯	以上皆是	D	從影片中可以看到吸毒的人有以下這些特徵：話變多、因為失眠產生的黑眼圈、走路不穩、搖搖晃晃、目光呆滯以及身上有奇怪的味道。但是這些只是初步提供給大家參考的特徵，依照吸食毒品的不同，有些特徵也會稍微有點不一樣，如：使用需注射的毒品的人，身上會有針孔...等。	
27	易	造成一個人去吸毒的原因可能有哪些？（複選）		家人有使用過毒品的經驗	身邊的朋友有人使用毒品	無法壓抑對毒品的好奇心	學校的壓力過大	A&B&C&D	一個人會吸毒可能是很多原因加起來產生的結果，家庭、學校、朋友都在我們的成長過程中佔了很重要的一部份，相對的我們也會特別容易受這些人影響，因此萬一自己上面的這些情況時一定要特別小心，並堅持對毒品說不。	
28	難	請問近期新興的毒品：咖啡包、奶茶包裡面含有什麼成分？		甲基安非他命	古柯鹼	以K他命為主含各種毒品的混合物	FM2	C	新興毒品受到重視的其中一個原因就是因為它的成份不只有單一的毒品，常見是以用K他命為主但是用多種毒品混合製成，而混合使用多種毒品會比使用單一毒品對健康的危害更大。	
29	難	美沙酮替代療法因為藥效時間長，通常一天只需要使用一次，因此被用來幫助使用什麼毒品上癮的人？		K他命	安非他命	大麻	海洛因	D	美沙酮是一種口服的二級管制藥品，作用與海洛因類似，因此被用來戒治海洛因的毒癮，由醫院或指定的診所提供給戒癮者並且只能在提供的場所內服用，其他優點包括：不必使用針頭施打所以可以減少相關疾病的傳染。	
30	中	目前我國用什麼花卉作為反毒運動的精神標誌？		太陽花	紫荊花	紫荊花	梅花	C	「紫荊花」是北黃菊科植物紫荊，北美印地安人常把它做成飲料來治療蛇、蟲咬傷，近期則被許多公司製成健康食品，因為它「健身」、「抗毒」的意義，故引為「反毒」的代表花卉。	
31	易	常常在電視新聞中聽到的「新興毒品」有可能會偽裝成什麼形式，讓同學們在無意間吃下它呢？（複選）	https://www.youtube.com/watch?v=G1YxL9wJVE&t=2s	果凍	軟糖	維他命	巧克力	A&B&C&D	新興毒品指的是數種混合型的毒品，不肖的販毒商人會將這類毒品包裝成零食的模樣以降低人們的戒心，並讓人誤以為吸食之後不會產生跟一般毒品一樣嚴重的後果，但事實卻是相反的，由於新興毒品裡面混雜多種毒品可能產生交互作用，因此對身體的危害反而比一般毒品更嚴重。	
32	中	不同毒品的吸食方式有很多種，請問下列哪些是常見的毒品吸食方式？（複選）		直接口服	利用針筒注射	加熱之後吸食煙霧	用鼻子吸進粉末	A&B&C&D	不同的吸食方式會導致吸食之後獲得的快感不同，尤其直接以針筒注射的方式通常是已經上癮很嚴重的人會使用的，這種方式雖然可以獲得很強的快感，但相對的身體負擔也很大，如果又施打過多的用量極有可能導致猝死。	

33	中	有許多建議修法將毒品犯罪的處罰門檻下降（犯罪會更容易成立），或是犯罪之後要給犯罪的人更多處罰，這種想法如果落實將會導致什麼狀況？		毒品犯罪率大大下降	進監獄一次反而認識了更多壞朋友	監獄擁擠的情況更嚴重	再度從事犯罪的情況減輕	B&C	目前對於毒品犯罪的處罰門檻已經不高，可是因為吸毒而被關進監獄的受刑人已經佔了很大一部分，如果再把處罰加重反而會和其他更嚴重犯罪的處罰失去平衡，使監獄更加擁擠。把他們關進監獄也不是萬靈丹，一旦在裡面又認識了犯相似犯罪的人，反而會讓他們相互學習造成以後回歸正常生活的困難。	
34	中	父母應該做到什麼事情，才能避免孩子接觸到毒品？（複選）		嘗試從小孩的立場去理解事情和溝通	直接命令小孩要順從大人的想法	讓小孩多元發展，培養各種小孩想從事的興趣	忽略小孩的情緒反應，認為只是一時的情緒不穩	A&C	家庭是避免小孩接觸到毒品的一道防線，如果父母能夠仔細觀察小孩的情緒反應，並適時傾聽他們，和他們有效溝通對話，將能有效降低彼此之間的隔閡，提升親子間的親密度；培養小孩的多元興趣不僅可以幫助其發現自己的興趣所在，也能讓他們的休閒生活有個重心，避免誤交損友或出入複雜場所，	
35	中	就算是從醫生那邊得到的藥品，一旦沒有遵守正確的用法和用量，也會落入藥物濫用的情況，請問下列哪個用藥觀念是錯誤的？		應該遵守藥師和醫師的指示吃藥	藥要全部一起吃，效果才會最好	在看診時應該告訴醫生目前正在服用的藥物	安眠藥不應該隨便給其他有失眠困擾的人食用	B	許多藥物混在一起吃之後可能會產生化學反應，因此應該仔細聆聽醫師及藥師的說明，並在看診的時候告訴醫師正在服用的藥物及身體情形，讓醫師能夠給出最適合身體狀況的藥品類別與劑量。	
36	中	毒品持續氾濫對國家整體會造成什麼影響？（複選）		在重刑化的政策下會導致監獄擁擠	對國民的身體健康有負面影響	國家整體競爭力下降	促進國家經濟發展	A&B&C	毒品氾濫會讓國家的勞動力減少，進而導致整體競爭力下降，另外在國家把毒品相關犯罪定為嚴重犯罪時，便會下修處罰的門檻造成起訴及被審判確定的案件增多，也就會有更多的人需要進監獄服刑，造成監獄過度擁擠。	
37	難	使用K他命後，可能會對人體產生什麼影響？（複選）		暫時性失憶	長期使用可能罹患膀胱炎導致頻尿	牙齒受損	產生分離性的幻覺	A&B&D	K他命是一種麻醉藥物，後來被當成迷幻劑濫用，使用之後會讓人失去對於外界環境的覺察，長期使用之後會造成膀胱發炎、膀胱疼痛，並且因膀胱容量變小而造成頻尿；牙齒受損則是使用甲基安非他命會導致的後遺症之一。	
38	中	為了躲避警探追緝，販毒集團的手法也跟著日新月異，請問近年來大量氾濫的新興毒品有以下什麼特點？（複選）		跟其他的毒品相較之下對身體的危害較輕微	每一包內含的劑量落差大	比起一般毒品對身體的危害更嚴重	內容物的成分單純	B&C	新興毒品通常由多種成分混合製成，因此每個包裝的劑量和成分也都不盡相同，在交互作用之下更會對人體造成更大的危害，另外雖然新興毒品的包裝還是跟一般的零食有點不一樣，但對於年紀較小的孩童、少年或沒有經驗的人來說可能難以辨識和一般包裝的差別，因此，在外面社交互動的場合，他人提供的包裝如咖啡包、糖果、糖粉、果	
39	難	藥物濫用的意思是，不是為了治病的需要使用藥物，沒有醫師的藥方用藥，沒有依照正確的用藥量、傷害健康及社會，下列哪些使用藥物的行為會被稱作藥物濫用？（複選）		將可以改善嚴重失眠症狀的安眠藥，用來迷昏他人，甚至趁機性侵	相信市面上流傳的聰明藥可以提升成績而使用	醫生用嗎啡幫助癌症末期的病人止痛	用藥程度達到傷身心健康及社會安全的程度	A&B&D	藥物濫用有以下四種情形：一、不是基於醫療上的需要而使用藥物，二、沒有依照醫師的處方而使用藥物，三、雖然是基於醫療上的需求使用藥物，但是過度使用，四、用藥程度達到傷害身心健康及社會安全的程度。	
40	難	在藥物成癮治療中，可以透過藥物治療減輕戒斷時的不舒服，下列有關藥物治療的說明，何者「錯誤」？		可以改善停止使用毒品所產生的憂鬱、疲倦、失眠等症狀	可以透過藥物治療降低想要使用某些毒品的慾望	只依靠藥物治療就能完全戒除毒品	可以控制藥物成癮所產生的生理疾病或精神疾病	C	部分毒品可以透過藥物治療降低想要使用的慾望，但並不代表可以絕對不去使用毒品，只依靠藥物治療是難以完全戒除毒品的，因此必須配合心理治療、生活重建、家庭支持等其他方式。	

41	易	對於毒品應該抱持什麼態度或想法？		偶而施用毒品 不會成癮，也 不會對身體健 康造成影響	心情沮喪的時 候，可以透過 毒品讓心情變 好	只要不施用 毒品，幫忙 運送、販賣 毒品也不會 違法	完全不要接 觸毒品	D	毒品容易使人上癮，即使出於好奇 心施用毒品，或是在他人的誘惑下， 也會忍不住再次施用。施用毒品 成癮的人，要真正完全戒除毒癮難 度不小。心情沮喪的時候，可以透 過培養正當興趣休閒和運動等方式 讓心情變好。依毒品危害防制條例 的規定，運送、販賣毒品的行為也 是違法。	
42	難	小涵使用某項毒品後，導致學習及記憶能力下降， 而且因為幻覺導致交通事故，小涵在懷孕期間， 仍然不斷使用某項毒品，導致早產、胎兒體重 偏低，請問小涵可能是使用什麼毒品？	FM2	一粒眠	大麻	懂他命 (K 他命)	C	使用大麻後會產生胡思亂想和幻覺， 容易發生危險，在青少年時期， 使用大麻會導致智商下降，學習及 記憶能力降低，若是在懷孕期間使 用大麻，則會導致早產，胎兒體重 偏低。		
43	易	下列哪些做法可以幫助我們遠離毒品？（複選）		避免去是非場 所（電動玩具 店、網咖、 KTV）	接受陌生人提 供的飲料、餅 乾	培養正當興 趣	認識正確 的用藥觀念	A&C&D	許多毒品透過餅乾、巧克力、咖啡 包等方式包裝，吸引學生的好奇心， 因此面對陌生人所提供的任何東 西都應該委婉拒絕。	
44	中	小陳幫朋友透過通訊軟體的方式，和其他人聯繫 購買毒品的細節，小陳的行為是否違反毒品危 害防制條例？		會，只要是和 販賣毒品有關 的行為，都會 違法	不會，小陳只 是負責聯繫， 與販賣毒品無 關	不會，小陳 沒有參與到 面對面販賣 的過程	不會，如果 小陳沒有收 錢，就不會 違法	A	無論是把風、聯繫、收款等，只要 是和販賣毒品有關的行為，都是毒 品危害防制條例所規定的販毒共犯， 因此會違反毒品危害防制條例。	
45	難	長期使用毒品後，身體會產生耐受性，下列有關 耐受性的說明，何者正確？		毒品對身心健 康的影響會越 來越小	使用毒品所產 生的效果可以 一直延續	使用的藥量 逐漸增加	對於不使用 毒品的忍耐力 提高	C	長期使用某些藥物後，身體內對藥 物反應產生改變，如果只使用原來 的藥量，無法達到原來使用的效果， 為了達到和前一次相同的效果， 便會需要增加藥量，導致藥量使用 逐漸增加，稱為耐受性。	
46	中	長期使用毒品的人會有和以前不同的行為，下列 哪些是使用毒品的人平常可能會出現的特徵？（ 複選）		食慾不振、嗜 睡	時而精神異常 亢奮、多話， 時而沮喪、不 安	常常翻課， 學業成績退 步	花費增加， 時常借錢或 是家中的貴 重物品被賣 掉	A&B&C& D	施用毒品的人平常有精神恍惚、眼 神渙散、朋友圈改變、金錢花費變 高（為了買毒品）、情緒起伏大等 異常狀態。	
47	易	小文的同學邀請他一起使用毒品，小文面對同學 的邀請應該怎麼做？		不好意思拒絕， 默默收下毒 品跟著用	如果拒絕就沒 有朋友，於是 找更多朋友一 起來使用	委婉的拒絕 他，並告訴 老師或家人	偶而使用毒 品對身體不 會有影響	C	收下毒品就是持有毒品的行為，會 違反毒品危害防制條例的規定，維 持朋友間的友誼可以一起做正確及 正當的事，例如：一起運動、分享 心事、看電影等等，而不是一起做 違法的事才是朋友、才講義氣。毒 品容易使人上癮，即使出於好奇心 施用毒品，或是在他人的誘惑下， 也會忍不住再次施用，容易走上成 癮的路。	
48	中	笑氣是吸入性的全身麻醉劑，吸入笑氣約30秒即 可發生作用，長期使用會導致肢體無力，濫用的 藥物依特性分為四個種類，請問笑氣是屬於哪一 類毒品？		中樞神經抑制 劑	中樞神經興奮 劑	中樞神經迷 幻劑	吸入性濫用 物質	D	笑氣屬於吸入性濫用物質，笑氣雖 未列為毒品或管制藥品，但是使用 笑氣可以依社會秩序維護法處罰， 因為常使用笑氣對人體還是有很明 顯的傷害。	

49	中	若是家人開始使用毒品，可能會出現什麼行為特徵？（複選）		作息不穩定、日夜顛倒	房門緊閉、反鎖	家中貴重財物遺失	與家人相處變得更熱絡	A&B&C	在家庭中施用毒品的人，可能會出現就業及就學不穩定、經濟困難、精神不健康等問題，面對家庭中有人施用毒品，其他家庭成員會感到羞愧，或是對於協助戒毒感到無力，許多因素相互影響，導致家庭內的互動關係不良，常會爭吵。	
50	難	「冰糖」時常被加入非法的減肥藥中，導致使用這類非法減肥藥的人不自覺中成癮，甚至會造成精神妄想症或精神分裂，下列有關冰糖的敘述，何者「錯誤」？		冰糖就是安非他命	冰糖被列為第二級毒品	冰糖具有抑制食慾的作用	冰糖是中樞神經抑制劑	D	俗稱冰糖的藥物就是安非他命，是一種興奮劑，被列為第二級毒品。長期使用安非他命可能會造成精神分裂症，症狀包括猜忌、胡思亂想、幻覺、強迫或重複性的行為、睡眠的嚴重問題等等。	
51	易	小婷發現在學校附近，有人在發送像糖果的搖頭丸，請問小婷可以採取什麼做法？		找同學一起去吃	拿一顆跟大家炫耀	當場拿一顆搖頭丸試吃	告訴學校的老師	D	如果發現有人在路邊發送不明的粉末或藥丸，應該告訴學校的老師或家長，請他們協助報警處理，不要抱著好奇心去嘗試而使自己陷入危險之中。	
52	難	中樞神經抑制劑有麻醉、安眠的效果，使用後常常會有嗜睡、昏迷及喪失短期記憶的情形，下列哪些是中樞神經抑制劑？（複選）		懂他命（K他命）	搖頭丸	海洛英	FM2	A&C&D	搖頭丸是中樞神經興奮劑，本題其他藥物（懂他命、海洛英、FM2都是抑制劑）	
53	易	小賢發現他的好朋友最近生活作息不正常，常常到處借錢，桌上還有不明的白色粉末，開始懷疑他的好朋友是不是在使用毒品，小賢可以用什麼方法幫助他的好朋友？		幫忙隱瞞使用毒品的事	告訴老師，請老師協助	吸毒跟我沒關係，不要理他就好	跟他一起使用毒品	B	使用毒品不只會對自己的身心健康產生危害，也會對家庭和社會秩序產生負面影響，因此可以告訴老師，請老師或其他相關單位提供協助，一起幫助朋友戒除毒品。	
54	中	阿嘉的同學邀請他一起使用毒品，阿嘉可以使用什麼方式拒絕他們？（複選）		阿嘉：「使用毒品是違法的，而且會傷害身體，我不要再吸毒。」	阿嘉：「使用毒品會傷害身體，我不要再吸毒，你也不要再吸毒了。」	阿嘉：「我看新聞說過吸毒會成癮，所以毒品真的是不能碰。」	阿嘉：「好吧，我試一次就好了。」	A&B&C	毒品容易使人上癮，即使出於好奇心施用一次毒品，或是在他人的誘惑下，也會忍不住再次施用，施用毒品成癮的人，要真正完全戒除癮難度不小，所以毒品真的是不能碰。	
55	難	有關毒品的相關法律規範，哪些敘述是正確的？（複選）		製造、運輸、販賣毒品的刑責比持有毒品更重	持有一級毒品的刑責比持有第四級毒品更重	只是拿著毒品向同學炫耀不會違法	未滿18歲的人使用毒品不會違法	A&B	拿著毒品的行為，在毒品危害防制條例上屬於「持有」的行為，會違反毒品危害防制條例的規定，雖然吸毒者未滿18歲，但仍會依少年事件處理法的規定處理。	
56	難	阿玲停止使用某種毒品後，出現冷火雞現象（指身體發冷及起雞皮疙瘩）、肌肉疼痛、腹痛等戒斷症狀，請問阿玲是使用下列哪一種毒品？		海洛英	懂他命（K他命）	FM2	搖頭丸	A	海洛英剛開始使用的時候，會有興奮及欣快感，接著會陷入疲倦、想睡的狀態，而海洛英的戒斷症狀會使身體感到極端痛苦，導致海洛英的使用者會再次施用海洛英，排除戒斷症狀的不適。	

57	中	下列有關毒品的說明，何者正確？		吸毒戒治後容易再犯，因此治療是沒有用的	在住家附近，發現有人有施用、販賣毒品的行為，可以通報警察	不使用毒品是謹小行為	使用毒品可以解決所有煩惱	B	戒除毒癮需要多方面（醫療、社工等）的協助，雖然施用毒品成癮的人，要真正完全戒除毒癮難度不小，但是在戒毒的專業人員以及社會資源的協助下，仍然有機會可以戒除毒癮。決定不使用毒品是維護自己權益的行為，並不是謹小的行為。使用毒品的當下看似脫離煩惱，但實際上是不能解決煩惱的。	
58	中	「拉K一時，尿布一世」是懂他命（K他命）對人體造成的影響，請問懂他命屬於第幾級毒品？		第一級毒品	第二級毒品	第三級毒品	第四級毒品	C	懂他命（K他命）屬於第三級毒品。	
59	難	美沙冬替代療法可以用於哪一類成癮者的治療，因此對於吸食海洛因成癮的人也有幫助？		可卡因類	羅菇菌類	大麻類	鴉片類	D	替代療法目的是讓成癮者服用美沙冬來代替吸食海洛因，讓成癮者能慢慢戒除對海洛因的依賴而聞名。但其實替代療法也可以用於其他鴉片類藥物(如：鴉片、嗎啡等，皆由罌粟花提煉而成)成癮的人，對於他們的毒癮戒除一樣有幫助。	
60	易	毒品犯案的問題除了從家庭和學校著手，社區也是防範的其中一環，請問下列什麼做法對改善毒品犯案的問題是有幫助的？		在社區中設置監視器	強化社區中居民的感情	成立社區守望相助隊定時巡邏	以上皆是	D	社區中如果多了監視器，一舉一動都會被監視器拍下來，相對的想在這個地區從事犯罪活動便會產生一定的難度，而增進社區居民的感情也有助於大家互相關懷，社區守望相助隊則可以巡查平常較少人經過的地帶，避免成為犯罪眼中絕佳的犯罪地點。	
61	中	如果今天你是老闆，對於有使用毒品前科的應徵者，用什麼態度對待他有助於他融入社會？		多一事不如少一事，找個理由拒絕他的應徵	用開放的心態鼓勵他，歡迎他成為公司的一份子	以維護公司裡氣氛的理由婉拒他	以上皆沒有幫助	B	一般人對於曾經吸食毒品或有其他前科的人經常會有不好的刻板印象，但是這些人裡面也有想要重新開始認真生活的人，我們可以先給他們一次機會，看他們的表現之後再做決定，而不是一開始就抱著先入為主的成見拒絕他們。	
62	易	小述在升上國三之後，因為升學壓力大，開始走上吸食毒品這條路。請問小述的行為會對他的家庭造成什麼影響？（複選）		為了跟家人要錢買毒品而激烈爭吵	吸食毒品後性格轉變，不開心的時候會把家裡的東西拿起來摔	小述與家人的感情愈來愈疏離	家人們為了小述的管教問題互相責怪	A&B&C&D	家庭成員中有人吸食毒品對其他人的生活會產生很大的影響，吸食毒品經常需要足夠的金錢支撐才能夠維持吸食，時間一久必定會產生金錢缺乏的問題；吸食毒品一段時間後也可能造成性格上的轉變，對於情緒的控制力將會減弱，因此會出於衝動就做出一些傷害的事情；其他家人無法理解吸毒的人，彼此之間也會因為沒有注意到吸毒的人的狀況而互相責怪或怨恨。	
63	易	與朋友出門玩樂時，請問下列何者是較不易接觸到毒品的場合呢？		密閉式的KTV包廂	深夜的宵夜網咖	人潮眾多的電影院	出入人士複雜的深夜電子遊樂場	C	舉凡是密閉的場合（包廂、KTV）、較昏暗（酒吧）、治安較不好（暗巷）或是出入人士複雜的場所（車站、網咖）都有可能是毒品交易的場合，因此要儘量別在這些聲色場所逗留。	
64	易	請問下列哪種情況可能是毒品出現在你身邊的前兆？		陪爺爺去參加里長舉辦的歌唱大賽	陌生人邀請你去試吃不知名的奇怪包裝食品	放學留下來與同學一起練習躲避球近來大賽	幫媽媽到巷口雜貨店買晚餐要用的調味料	B	現在毒品已經演變，且被包裝成不同以往型態，為了避免有警方尚未追查到新型毒品，對於所有來路不明的食品都務必小心求證。	

65	易	假如使用毒品的話，我的未來不會是下列何種狀況...？		常覺得錢不夠用，而產生偷竊的念頭	與家人的關係變差	生活快樂，無憂無慮	與未使用毒品的朋友們漸行漸遠	C	使用毒品後的生活常會因為對毒品成癮，藥物的用量會越來越高，導致經濟無法負荷而開始出現歹念，如：偷竊搶劫等，因此是完全無法與快樂生活、無憂無慮畫上等號的。	
66	易	「不要吃來路不明的食物」是大人經常告誡小孩的話語，因為毒品跟某些藥物經常隱藏成我們熟知的食品，而我們卻不易察覺。請問，毒品或非藥物可能化身為下列哪種食物呢？		小熊軟糖	仙潼餅	維他命C	以上皆是	D	現在毒品已經演變，且被包裝成不同以往型態，為了避免有警方尚未追查到的新型毒品，對於所有來路不明的食品都務必小心求證。	
67	易	請問下列哪些因素不能保護我遠離毒品？		和家人保持良好親密的互動，儘可能每天要盡可能有一段愉快的相處時間	培養一群好朋友，建立感情聯繫，彼此分享生活樂趣、釋放壓力	維持規律運動，儘管很忙也不忽略這個好習慣	透過偷抽菸來忘記對生活的不滿	D	百毒菸為先，一但接觸了成癮物質，別人就有更多機會對你下手，因此儘可能養成好習慣（多運動、規律作息、不飲酒抽菸等等），才是遠離毒品危害的上上法則。	
68	中	請問下列哪一位最可能身陷毒品的威脅？		明賢想擁有跟韓國偶像一樣的身材，所以加入學校羽球社來瘦身	阿海因為母親長期酗酒、無收入，為養活自己，而長期在出入人士複雜的夜店打工	李良為了放鬆平時讀書的壓力，固定在放學後約同學慢跑	宗順每天都練習吉他，希望有朝一日可以靠此達到心儀的女孩	B	阿海長期日夜顛倒為了賺錢處在賭蛇混雜的場所，這無疑是把自己置身於危險之中，出入人士超複雜的地區，就難避免碰到毒品的交易，也就把自己暴露於毒品的範圍之中了，此外，父母有使用菸酒、非法藥物時，會增加青少年對於此類物質的可近性，亦容易使青少年學習模仿，而使用毒品的青少年多有共通的特質：面臨生活挫折或情緒低落難以排解，因此培養適當的紓壓管道也很重要。	
69	中	今天有一位國中同學長邀請你的好朋友阿亮去參加一位大哥的生日派對，地點在一家看起來很舊、怪怪的KTV，而且還威脅他說：「你敢不來幫大哥慶生，到時候就走着瞧！」，阿亮很害怕，所以請你陪他一起去，但是你深知這可能是有危險的活動，請問下面哪一種應對方式最可能讓你們兩個人陷入毒品、暴力的威脅中，應該要避免的呢？		小心地向信任的老師報告這件事，並尋求老師的幫助	鄭重的跟父母親說這件事，讓他們評估事情的嚴重程度	義氣相挺，勇敢地陪阿亮去參加派對	跟阿亮說自己有補習，無法過去，並勸阿亮找理由拒絕對方	C	青少年使用毒品的原因主要有二，一是好奇，二是難以拒絕同儕的邀請，因此選擇安全的環境是我們避開毒品的首要關鍵。在自己的能力範圍內幫助朋友才稱之為義氣相挺，若是在這種自顧不暇得情況下陪阿亮去參加派對，除了無法解救阿亮以外，更是把自己的未來賠進去了。	
70	易	下列哪一種花卉被北美洲的原住民用來治療蟲、蛇咬傷，具有「強身、抗毒」的功效，而曾經被引用為反毒花卉呢？		小雛菊	蓮花	紫錐花	野百合	C	紫錐花在古早時期被北美洲的原住民用來治療蟲、蛇咬傷，具有「強身、抗毒」的功效，引此被引用為「反毒花卉」。	
71	中	為何不能吸食大麻呢？請問下列何者不是大麻可能會帶來的壞處？		破壞大腦的認知功能	損害呼吸道	提高大腦工作效率	可能會上癮而重複使用，浪費金錢	C	吸食大麻會導致大腦的損害，會引起妄想、幻覺、心跳加速，大腦認知功能降低等等，甚至會引發交通事故，由此可知，吸食大麻無法提高大腦工作效率。	
72	中	請問下列哪一種咖啡包疑似毒品咖啡包？		(p1圖)	(p2圖)	-	-	A	選項一的奶茶包裝不完整，仔細看文字甚至被裁切掉，應是被人拆封後重新包裝的，因此可能有被摻雜毒品粉末在內的危險。	選項A: p1 選項B: p2

73	中	以下哪一種藥品原是用於動物的全身麻醉劑，但最近研究顯示濫用會導致慢性間質性膀胱炎呢？		安非他命	懂他命	FM2	海洛因	B	懂他命為一種全身性麻醉止痛劑，濫用懂他命會導致頻尿，因為膀胱已經纖維化。	
74	中	以下哪一種藥物常被醫生用來當成麻醉藥品使用，若未經醫師允許濫用就變成毒品呢？		安非他命	嗎啡	搖頭丸	海洛因	B	嗎啡是醫生進行手術時，為減輕病人的疼痛所使用的止痛藥物，仍受政府管制。	
75	中	以下哪種毒品常在舞廳、夜店被誤用來跳舞助興？		懂他命	嗎啡	搖頭丸	大麻	C	搖頭丸使用過量會心悸過速、體溫升高，甚至身體缺水而死亡。	
76	難	以下哪種藥物常被用來當作安眠藥，後曾被用作於約會強暴藥物之一？		古柯鹼	神仙水	搖頭丸	安非他命	B	神仙水又名為液體快樂丸，本身無色、無嗅、無味，且帶有讓人喜悅、憧憬、暫時性記憶喪失的效果，因此又常被濫用於約會強暴等犯罪。	
77	難	請問下列哪一項不屬於強暴藥物？		氟硝西泮 (FM2)	神仙水 (GHB)	懂他命 (Ketamine)	嗎啡 (morphine)	D	1) 氟硝西泮 (FM2)：作用為一般安眠藥的十倍強，安眠效果長達8-12小時，因此常用於性犯罪，手法為加在飲料中迷昏特定人物。 2) 神仙水 (GHB)：作用和FM2相似 3) 懂他命：又叫K他命、K仔，會讓人變成說不清楚、手足不協調。 4) 嗎啡是醫生用於麻醉使用的藥物，痛起來有股酸苦味，容易戒癮	
78	易	請問下列哪些可能是新興毒品的出現型態？		面容猙獰的小熊軟糖(p3圖)	品牌未知的奶茶包(p4圖)	散裝的果凍、糖果(p5圖)	以上皆是	D	https://www.youtube.com/watch?v=s8HahzLqWAE 檢察官拍攝反毒影片2016 現在毒品有許多新興樣態，請各位小朋友外出時特別注意，切莫取用來路不明的食物、飲料，若因一時口慾，而賠上美好的青春歲月，可真是得不償失了。	選項A:p3 選項B: p4 選項C:p5
79	易	請問何種行為不可以幫助自己遠離毒害？		拒絕前往密閉式的卡拉ok	參加出入人士複雜的party	養成規律作息，培養合適的舒適運動	陪爸爸媽媽戒掉抽菸喝酒的習慣	B	出入人士複雜的地區，碰到毒品的交易機率就難免提升，也就等同是把自己暴露於毒品的範圍之中了。	
80	中	邪惡的喬巴醫生舉辦了一場生日派對，並且拿了一罐據說吃了會很會跳舞，而且吃一次不會上癮的搖頭丸給大家吃，喬夫也在現場，請問你覺得他應該採取下列哪一種做法呢？		相信喬巴醫生的話，決定嘗試看看這藥丸，並在心裡想著只要這一次，以後絕對不再碰	為了不顯得自己很膽小，所以帶頭吃看看	不要拒絕他的好意，並一起服用狂歡	跟朋友說自己尿急，先尿遁離開現場，在想辦法找理由離開這場毒趴	D	使用遠離現場法可以幫助喬夫先離開那個危險的環境，以免被強迫使用毒品，再想辦法找更合適的理由或時機幫助自己逃離。	

81	中	「藥物濫用」的行為是造成毒品氾濫的原因之一。請問下列何者的行為不屬於藥物濫用？		譚燕姮有失眠的困擾，所以長期去藥房買安眠藥，但是近幾個月來開始覺得安眠藥的效果不太好，因此自己增加用量。	明遙姐妹兩人都有嚴重的經痛困擾，只要開始感到不適，他們就會抽一根大麻菸來降低疼痛。	張克祥醫師負責照顧癌症末期的病人，但因他們飽受病痛折磨，因此醫師使用嗎啡幫他們止痛。	李敬熙熬夜唸書，自己到藥局購買藥物提神。	C	醫生開藥時，有一定劑量的限制，但如果患者回家後自行增加藥物的使用量，很可能會形成藥物濫用的問題，也可能使自己對該藥物上癮陷入戒斷症的漩渦，難以自拔。	
82	難	請問下列何者是香菸會讓人上癮的主要物質呢？		菸鹼	尼古丁	古柯鹼	萊汀香	B	尼古丁是香菸的主要成分，也是其會讓人上癮的主要原因，其餘還有許多分子是菸草高溫燃燒後，被吸入體內而形成的致癮因素。	
83	易	吸毒的人經常有共用針頭的習慣，因此有一種會經由血液傳染的疾病較容易在這群人之間傳染。請問是下列何者呢？		子宮頸癌	登革熱	愛滋病	猩紅熱	C	許多毒品需透過施打的方式進入體內，但針頭不一定能隨時取得，因此吸毒者常有共用針頭的現象，導致愛滋病在藥物濫用的圈子裡蔓延。	
84	中	請問下列有關毒品的敘述，哪一個觀念是錯誤的？		除了大人之外，小朋友也要有辨識毒品的能力、拒絕毒品的技巧。	就算跟朋友斷絕關係，也絕對不要碰毒品的技巧。	偶爾吸食毒品對身體及心理會造成極短暫的傷害。	為了逃避緝毒或警方追查，毒品可能做成食物或是飲料的包裝。	C	只要吸食毒品就會在身體或心靈留下一定程度的傷害，儘管有專業人士陪伴還是需要長時間才能完全復原。	
85	易	唐棠與男朋友分手了，他說因為兩個人要講不同的國中，無法好好相處。唐棠因此非常的難過，請問下列哪個才是合適情緒紓解方法呢？		跑去男友家裡跟他大哭大鬧。	躲在房間整日以淚洗面。	找年長的家人講這件事，舒解情緒，也聽聽他的建議。	聽大人說借酒消愁，但又不敢在家裡喝，所以躲到朋友家偷偷喝。	C	透過安全的管道抒發情緒，才能保障自己的心理健康與生理安全。其他三個選項，無論是去男友家還是朋友家都有可能遭受性、暴力的傷害，選擇以淚洗面則是對自己心理健康的一種傷害。	
86	易	下列對於毒品的態度，何者錯誤？		堅持說不	偶而試一下沒關係	遠離而不接觸	提高警覺不隨便接受陌生人之飲料、食物	B	對於毒品千萬不能苟且一試，這往往是萬劫不復的第一步。	
87	中	參加party、很熱鬧的活動時，採取下列哪種方法，可以避免喝到被摻入毒品的飲料呢？		選塑膠包裝的飲料來喝	為表示禮貌，別人幫我們倒的飲料，至少不要喝一口。	挑純透明、沒有粉末的飲料，就不會有被摻入毒品的可能。	以上皆非	D	出入聲色場所，人士複雜的地方時，所有裝下肚的飲食都要防範有心人士動手腳。像是：塑膠包裝的飲料很容易被針孔扎破下藥，所以即使包裝紙沒拆開也要很小心；陌生人在為你倒的飲料時，或許已經偷偷摻入藥物；很多強暴藥物都是透明無色無味，肉眼根本無法分辨，等你發現身體不受控制時，往往都已經太晚。參考出處：台南市政府106寒假反毒知識學習單-國小高年級。	
88	中	使用毒品會導致嚴重的身心傷害，影響身體的哪些器官？		腎臟	肝臟	腦部	以上皆是	D	使用毒品會傷害人體三大系統：泌尿系統、循環系統、神經系統，被包含在這些系統中的器官也會跟著受到損壞，甚至難以治癒。參考出處：台南市政府106寒假反毒知識學習單-國小高年級。	

89	男	下列有關毒品的敘述，哪項是對的？		吃幾次而已的話，是不會上癮的	未成年學生吸食毒品是不犯法的	只施用一次毒品也會造成身體的傷害	毒品可以幫助忘記生活中的不快樂	C	解析：就算只使用一次毒品也有可能會在腦部留下創傷，或是難以忘懷它的滋味，導致自己深陷毒害之中，因此切莫以身試毒。參考出處：106年反毒健康小學堂參考題庫-國小版題庫
90	難	為什麼吸毒者這麼難戒除非法藥物呢（毒品）呢？		因為這些藥物具有成癮性	吸毒者一旦戒掉毒品，身體就會出現戒斷症狀，如：顫抖、發冷	因為吸毒者難以忘記當初吸毒的快感，為了逃避現實又陷入毒品的魔爪中	以上皆是	D	使用非法藥物除了獲得當下的快感以外，更要承擔隱藏的風險，如：藥物的成癮性、耐受性、生心理對藥物的依賴等等，一旦不使用毒品，或是劑量不足時，就可能引起令人不舒服的藥物戒斷症狀，這是許多戒毒者反覆戒毒的原因之一。參考出處：106年反毒健康小學堂參考題庫-國小版題庫
91	中	藥物濫用者在人際生活上較不容易有下列哪種症狀？		日夜顛倒，生活作息不規律	交友複雜，常有特殊人士	個性堅強，有自己的原則	缺乏主見，容易受他人唆使	C	藥物濫用者的藥效不定時發作，且他們為了避免被他人發現常需躲躲藏藏，因此較難作息規律，加上會選擇用吸毒逃避現實者的心態多半較不堅定、對自己缺乏信心。參考出處：106年反毒健康小學堂參考題庫-國小版題庫
92	中	請問吸毒的學生通常有什麼特徵？		生活作息規律	在校的表現優良，能在學習上獲得成就感	家庭功能不全，缺乏家長的關懷與陪伴	有均衡飲食跟規律的運動習慣	C	家庭關係不良，或是子女在家中的感受經常被忽略，容易增加子女使用毒品的機率，是學生吸毒的危險因子之一，參考出處：法務部——反毒大本營：青少年非法藥物（毒品）使用之危險因子 https://antidrug.moi.gov.tw/cp-186-6241-1.html
93	中	魏霆超的學校同學手上拿著一包塑膠袋，裡頭有透明膠體，邀她下課後一起去嗨一下，但是魏霆超在朝會時聽老師說最近學校有人在吸食強力膠，那會造成腦部損壞，請問她怎麼做會保護上癮呢？		尋求老師的幫助	跟同學一起去體驗看看再說	堅持拒絕，絕不因為是同學就心軟答應	因為怕被欺負，所以我找理由婉拒對方	B	毒品對身體的傷害太大，千萬不可以心存僥倖地嘗試。平時可以練習「天龍八不」的拒絕法，來增加自己遠離麻煩的技巧。出處：新北市警察局三重分局 拒毒八招 https://www.sanchong.police.nipc.gov.tw/cp-454-11084-17.html
94	難	譚米在學校裡遇到大學長向他推薦一種可以提振精神、讀書更有效率的菸，但是譚米為了身體健康和維持良好的偶像形象，所以跟學長說：「不好意思，學長，我不太喜歡拿內容物標示不清的物品，所以真的不能買，謝謝囉！」請問譚米用的是下列哪一種拒絕法呢？		遠離現場法	友誼勸服法	反激將法	告知理由法	D	告知學長自己的家裡不允許使用非法藥物，並且因為要珍惜粉絲的支持，所以絕對不能碰這些藥物。參考出處：新北市警察局三重分局 拒毒八招 https://www.sanchong.police.nipc.gov.tw/cp-454-11084-17.html
95	難	廖雲和鄭正是好朋友，最近廖雲交了一個男朋友，陪他吸食一種奇怪的氣球裡面的空氣，甚至邀鄭正一起分享，說這個吸完後會很放鬆。鄭正勸廖雲說：「我們是好朋友，不想看你因為這種短暫的快樂而傷害自己……我不會嘗試，你也趕快戒掉吧！」請問鄭正用的是哪一種拒絕法呢？		轉移話題法	友誼勸服法	堅持拒絕法	反激將法	B	鄭正從愛情的誘惑出發，用十年的友誼來勸朋友別再吸毒，因此是友誼勸服法。參考出處：新北市警察局三重分局 拒毒八招 https://www.sanchong.police.nipc.gov.tw/cp-454-11084-17.html
96	易	每次朋友請他抽菸時，他都會有不同的拒絕法，請問下列哪一個情況是採用「遠離現場法」呢？		朋友請他抽菸時，他會說「哎呦！我阿公就是抽菸死於肺癌，所以我不抽煙啦！」	看到朋友拿菸出來，就說「幹！你們怎麼還在吸這種過時的東西啦！」	朋友笑他都不抽菸時，就說「哎呦，我就比較膽小啦，如果被抓到會被處罰噢！」	朋友要抽菸時，就假裝接電話，趕緊去他們看不到的地方	D	(a)告知理由法(b)反激將法(c)自我解嘲法(d)遠離現場法參考出處：新北市警察局三重分局 拒毒八招 https://www.sanchong.police.nipc.gov.tw/cp-454-11084-17.html

97	易	常有人誤以為只要多喝水就可以加速代謝掉毒品，讓警察驗不出來，但是現在有許多方法可以檢測，請問下列哪一種做法可以檢驗出有施用毒品的人呢？		快速尿篩	血液篩檢	毛髮檢驗	以上皆可	D	快速尿篩、血液篩檢、毛髮檢驗這三項是目前最常用的篩檢方式，其中毛髮檢驗除了驗出是否有使用毒品以外，更可以知道使用毒品的時間長短，參考出處：106年反毒健康小學堂參考題庫-國小版題庫	
98	易	以下幾個學生對於毒品的想法，哪一個較安全，不容易受到毒品傷害呢？		凱凱覺得大多數的青少年是選擇不吸毒，所以我們要堅持拒毒的原則	慧慧以為偶爾嘗試毒品才不會上癮呢	慧慧覺得自己已有堅強的意志力，就算不小心成癮也很容易就能靠意志力戒除毒品的！	小花的哥哥相信大家一起抽菸、吸毒，可以增進情感，交到好朋友。	A	堅持拒毒，才是保護自己、保護別人的不二法則，參考出處：106年反毒健康小學堂參考題庫-國小版題庫	
99	易	小莉要出門參加超人氣網紅的聚會，請問小莉要注意下列哪些事項？		邀約的地點如果太偏僻、太隱密就趕緊離開	活動中別喝太多飲料，尤其是避免飲料離身	不要嘗試來路不明的糖果、藥丸	以上皆是	D	參加不熟悉人士的聚會時要小心人身安全，注意飲料不離身、不接受陌生人士的食物等。	
100	難	蓋蓋雖然才國小，但是因為很會打電動遊戲，今年暑假就帶著阿基還有他國中的哥哥升等拿到金牌，為了感謝他，阿基就偷拿一包姊姊的讀書時會偷偷吸的白色粉末來送他.....阿基的姊姊每次吸完藥，就會精神飽滿、不吃飯、不睡覺，可以很專心的做自己的事，請問這包白色粉末可能是什麼呢？		懂他命	神仙水	搖頭丸	安非他命	D	安非他命屬於中樞神經興奮劑，可以壓抑人體對疲勞的感受，也因為可以抑制食慾，所以常常被加在減肥藥裡來使用，參考出處：106學期反毒知識學習單—國小中、年級版	
101	中	蓋蓋雖然才國小，但是因為很會打電動遊戲，今年暑假就帶著阿基還有他國中的哥哥升等拿到金牌，為了感謝他，阿基就偷拿一包姊姊的讀書時會偷偷吸的白色粉末來送他.....蓋蓋覺得這包藥粉很酷，但是他不敢自己拿來吃，於是他就放在書包裡帶去學校，跟好朋友炫耀，請問蓋蓋的行為有犯法嗎？		犯法，但因為他未成年，所以不會被處罰。	沒有犯法，因為他沒有吃，只是帶著而已。	犯法，只要非正當理由持有毒品就犯法	沒有犯法，他只是拿來炫耀而已，沒有賣給同學，所以不犯法。	C	依據毒品危害防制條例規定，只要非醫療、研究或訓練用者，而非法持有毒品，皆是違法行為喔！就算未成年持有毒品一樣也是有刑責的，參考出處：衛生福利部食品藥物管理署反毒資源館	
102	難	蓋蓋雖然才國小，但是因為很會打電動遊戲，今年暑假就帶著阿基還有他國中的哥哥升等拿到金牌，為了感謝他，阿基就偷拿一包姊姊的讀書時會偷偷吸的白色粉末來送他.....某天蓋蓋鼓起勇氣試用那包神奇粉末，結果他那天居然連續打電動打了12個小時，到隔天早上去學校都不覺得累，而且還拿到很多的寶石獎勵！蓋蓋覺得這個藥粉真是太厲害了，不知不覺從一個禮拜用一次變成天天都用，很快的，他那包藥粉就用完了.....請問下列哪一項不是吸毒者可能對社會帶來的影響？		精神狀況異常，而做出奇怪的舉動，一旦沒使用藥，身體就會出現戒斷症狀而非常不舒服	食用太多可能會因腦溢血而死	身體對藥物的耐受性增加，需要的毒品量越來越多，最後不得不去偷東西來換錢	以上皆是	D	吸毒會影響人體的神經系統，造成判斷不良，加上對藥物產生依賴性，無法獨自戒掉，不敢向外求助，卻又需要投入大筆金錢來換取毒品，最終學會產生對社會的危害，如：偷拐搶騙等等，因此吸毒傷害的不只是自己的身體，更是整個社會的品質。	
103	中	蓋蓋雖然才國小，但是因為很會打電動遊戲，今年暑假就帶著阿基還有他國中的哥哥升等拿到金牌，為了感謝他，阿基就偷拿一包姊姊的讀書時會偷偷吸的白色粉末來送他.....如果小希的姊姊和蓋蓋都下定決心想要戒毒，請問他們還可能面臨下列哪一種情況呢？		政府有留一絲機會給想要改過自新的人，因此他們可以向醫療機構請求矯治，而不在警察局留下案底	只要他們去尋求醫院的幫助，就一定會在警察局留下案底	因為他們都還未成年，所以不論去醫院矯治幾次都不會被抓起來	以上皆非	A	根據毒品危害防制條例第21條：於犯罪未發覺前，自動向衛生福利部指定之醫療機構請求治療，醫療機構免將請求治療者送法院或檢察機關，但以一次為限，因此如果不小心吸毒的人是有一次機會可以改過自新的！參考出處：106年反毒健康小學堂參考題庫-國小版題庫	
104	難	請問下列哪一種非法藥物沒有被歸類在毒品的分類中，但是長期使用會產生慢性癮，造成神經壞死呢？		冰毒	鴉片	嗎啡	笑氣	D	笑氣是一種局部性麻醉，通常用於牙科手術，但因為價格便宜、容易取得，所以常常被年輕人誤用在狂歡時炒熱氣氛，也常有因與其他藥物混用而導致施用者暴斃的新聞發生，出處：衛福部—反毒大本營：氫化亞氮	

105	難	當安非他命成癮者停止吸食時，身體會出現沮喪、疲倦、憂鬱、嗜睡、肌肉疼痛等症狀，有些人甚至會產生自殺的念頭，請問這種現象為何？		抗藥性	耐受性	戒斷症狀	習慣症狀	C	身體出現沮喪、疲倦、憂鬱、嗜睡、肌肉疼痛等，甚至有些人會產生自殺的念頭，屬於停用安非他命後會產生的戒斷症狀，令使用者感到不適，想盡辦法再度取得藥物。 參考出處：105年反毒健康小學堂	
106	中	請配對出屬於「約會強暴丸」特性的組合。甲、無色無味。乙、不易隔出來。丙、會使飲料混濁。丁、會讓人短暫失憶。戊、有一點點甜味		甲丙丁	甲乙丁	乙丁戊	甲丙戊	B	約會強暴藥物多具有安眠藥或使人失憶的特性，加上其無色無味，被害者通常服用後難以自知，因此切莫再吃離開過自己視線的食品。	
107	易	下列關於吸毒成癮的敘述，何者正確？		吸毒者僅傷害自己的身體，不影響自己的家庭	吸毒不會導致違法、偏差行為的發生	停用毒品後就不會影響身體健康了	吸毒會導致身體疾病，影響生活、學習及工作，也會毀了自己的家庭	D	吸毒對身體有嚴重的傷害，而且難以戒除，吸毒後的精神狀況往往在非常人所理解，很可能做出自己無法想像、控制的事情。此外，當毒品產生抗藥性、耐受性時，會需要花更多的金錢去購買藥物來獲得滿足，是件嚴重耗損家財的事情，有許多人甚至因此而家破人亡。參考出處：105年反毒健康小學堂	
108	難	請問下列哪一項可能是有學生在校園內吸食安非他命的徵兆？		教室抽屜裡出現打火機、以及有兩根管子連著的玻璃瓶	教室有塑膠味	經常打瞌睡	以上皆是	A	燃燒後有塑膠味，放在錫箔紙上燃燒後吸入都是屬於燃燒他命時才會有的現象。	
109	難	圓圓、隆隆是兩位熱愛音樂的學生，在賽跑時偷跑出家門去看演唱會，但殊不知，劇場他們居然不小心看到有大哥哥大姐姐們在偷偷吸食一些白色粉末和藥丸.....圓圓、隆隆還聽到幾首歌就被一位中年大叔推著一種藍色的藥丸，聽說可以讓他們聽歌時更嗨、更能跟著音樂搖擺，隆隆毫不猶豫買了兩顆來試看看，沒多久圓圓就看到他一直在跳舞，跟著音樂舞動，而且還一直冒汗，體溫升高，請問隆隆可能是吃到什麼藥呢？		鴉片	笑氣	冰毒	搖頭丸	D	搖頭丸常被用在舞廳、派對時助興，施用者會對燈光更加敏感，且隨之起舞，但真實用是會體溫升高、口渴、嚴重者可能會導致缺水而死。	
110	中	圓圓、隆隆是兩位熱愛音樂的學生，在賽跑時偷跑出家門去看演唱會，但殊不知，劇場他們居然不小心看到有大哥哥大姐姐們在偷偷吸食一些白色粉末和藥丸.....在面對推銷大叔時，圓圓當下就跟大叔說，自己把錢包忘在朋友那，要去找一下朋友，請問這是用了哪一種拒毒方法呢？		告知理由法	反激將法	轉移話題法	遠離現場法	D	圓圓假裝自己沒帶錢而趕快離開交易現場，是利用遠離現場發來幫助自己暫時遠離那個環境，思考一個更完善的解決辦法。	

是非題						
編號	難度	題目(必填)	多媒體檔名	答案	詳解	詳解多媒體檔名
1	中	請問，透過吸食毒品安非他命抑制食慾、幫助減肥是合適的方法嗎？		錯誤	解答詳如影片 https://www.youtube.com/watch?v=mbWZUqThpcg	
2	中	如果我有堅強意志力的話，就可以偶爾嘗試一次毒品的滋味而不會上癮。		錯誤	只要使用毒品就有上癮的機率，尤其是心理依賴很難戒除。	
3	中	只要多喝水、多喝牛奶，搭配上多運動，就可以把毒品排出體外，不用擔心會上癮。		錯誤	藥物成癮有兩種性質，生理成癮跟心理成癮（依賴），上述行為並不能完全杜絕成癮的發生，因此最佳的杜絕方法還是拒用毒品。	
4	難	使用排毒針可以幫助體內加速代謝，毒癮者可以藉由排毒針快速排除體內毒品，不被警察發現。		錯誤	排毒針主要內容是葡萄糖液、水，跟多喝水一樣，並不能加速毒品的代謝，而起被警察抓到時，還是會被驗出來的。	https://www.youtube.com/watch?v=zRDYq_D0BAE

5	難	安非他命常被濫用於幫助減肥，但有眾多副作用，在我國為醫療上禁止使用之藥物。		正確	安非他命屬於中樞神經興奮劑，使用初期會抑制食慾、心跳加速，長期使用可能會產生幻覺、妄想型精神分裂，請小朋友務必遠離毒品的危害。	
6	易	FM2是無色無味的毒品，常被壞人加在離開視線的飲料中，使飲用者昏迷無法反抗。		正確	FM2又稱為約會強暴藥物。	
7	難	法律上有給初次被查獲使用毒品的人，如果自願戒治，可以有改過自新的機會。		正確	是的，該條文的立法精神是「給不小心犯錯的人一次改過自新的機會」，但切莫因此心存僥倖，而嘗試毒品，毒品的危害一旦造成，就難以抹滅了。	
8	中	菸、酒、檳榔常是毒品的入門物質，這些東西也會造成上癮的現象，且會大幅提升使用者接觸到毒品的機率。		正確	菸、酒是入門級的成癮藥物，調查顯示，在矯正機關的毒品成癮者，極高比例皆有吸菸的習慣。 參考出處：衛生福利部-菸是青少年的「入門藥物」，不可輕忽！ https://www.mohw.gov.tw/cp-2648-20192-1.html	
9	易	如果不接觸入門物質（菸、酒、檳榔等），可以降低人們接觸到毒品的機率。		正確	俗話說：百毒菸為先，一旦接觸了這些成癮物質，就有更多機會接觸到毒品，因此儘可能養成好習慣（多運動、規律作息、不飲酒吸菸等等），才是遠離毒品危害的上上法則。	
10	易	多數使用毒品者上癮後，每次的使用量會越來越大才能達到最初的效果，因此很多毒癮患者為了買更多毒品而傾家蕩產，在沒錢買毒品但又毒癮發作時，就會犯下強盜、偷竊等行為，造成社會動盪、家庭破滅。		正確		
11	中	吸毒可能會讓腦袋變遲鈍，但是不會讓人死亡。		錯誤	吸毒除了傷身、傷腦，更存在著使人猝死的風險。	
12	難	許多醫學用藥跟毒品的成分類似，甚至相同，但若因為人們過度使用，或用於錯誤目的，就會導致它們對人體造成傷害，仍會被列為毒品的範疇。		正確	毒品是依其成癮性、濫用性及對社會危害性而分級，許多榜上有名的藥物都是醫院的合法藥物，但因被錯誤使用、濫用才導致這些藥物對身軀、社會造成危害。	
13	中	網路上說吸食大麻的成癮性比吸菸還低，因此可以吸大麻而不會上癮。		錯誤	大麻還是會使人上癮，而且會造成腦部損害，甚至有許多交通事故是因吸食大麻而造成的。	
14	難	FM2通常無色、無臭，但有特殊氣味，因此需要加在飲料裡，才不要被察覺。		錯誤	FM2通常是無色、無味的粉末或藥丸，因此加在飲料、食物裡幾乎不會被發現，若食品、飲品離開視線範圍後，就絕對不要再飲用，才能避免藥物的危害。	
15	易	現在的新興毒品經常以各種糖果的樣貌出現在國小周邊，包括小熊軟糖、彩色硬糖，甚至茶包、奶茶包、咖啡包等等都有可能是毒品的偽裝。		正確	因此要避免拿取陌生人給的零食、飲料，避免毒害的威脅。	
16	難	毒品單獨使用不會造成死亡，混合使用兩三種毒品才會對生命造成威脅。		錯誤	就算單獨使用毒品也有因為使用過量、或身體反應不良而死亡的風險存在，況且非法管道為了降低毒品的成本，多混合數種藥物來濫竽充數，因此吸毒死亡的風險性極高。	
17	難	吸菸會造成肺部傷害，還有尼古丁會使人上癮，但現在出了很厲害的香菸濾嘴，只要吸菸前塞上濾嘴，就不用擔心菸對身體的傷害了。		錯誤	吸菸的高溫本身就會傷害我們的呼吸道，加上濾嘴只能過濾大分子（如：焦油），而其絲造成成癮現象的小分子（如：尼古丁、乙醛）直接進入體內，沒有大分子的阻擋反而更容易產生成癮現象。	
18	易	吸菸並不會有成癮現象，因此只要有決心跟毅力，誰都可以完成戒菸。		錯誤	香菸中的尼古丁會使人停止吸煙後陷入戒斷症中，因此許多人反覆戒菸卻難以成功。	
19	中	藥物濫用成癮者只要習慣用藥的劑量後，身體就不會再有不舒服的症狀出現。		錯誤	藥物多有耐受性，當使用劑量維持一定時間後，使用者就會逐漸無感，需要增加劑量來維持效果，長久下來就有可能提高因藥物使用過量而致死的風險。	
20	難	如果在公共場所聞到刺鼻的味道應立即遠離。		正確	很多毒品的在使用時都伴隨刺鼻的味道，應多加注意。	

21	難	廁所裡出現燒塑膠的臭味，加上垃圾桶內有燃燒過鋁箔紙、打火機，這可能是有人吸食毒品的跡兆，應該趕快告訴師長，請他們協助找出施用的同學，儘早幫助他遠離毒害。	正確	燒塑膠的臭味是燃燒他命跡象，加上使用打火機加熱鋁箔紙上的K粉是常見的吸毒手法，故可以得知。	
22	中	吸毒者傷害的只有自己的身體跟未來，對於家庭沒有影響。	錯誤	吸毒者傷害自己的身體，也會造成父母的心碎，加上吸毒者的精神狀態往往每況愈下，會拖累家人放棄原有的生活來照顧他，甚至需要花費數不清的錢來幫助他回歸社會。	
23	中	成癮者主要是因為使用藥物帶來的快感太過強烈，而使他們逐漸不再關注其他的休閒娛樂，即便身體已經受到明顯損害也無法停止。	正確	成癮者對藥物的心理依賴極高，加上生理戒斷症狀會使患者難以離開毒品。	
24	難	禁煙節（六月三日）是從明朝流傳至今的。	錯誤	清朝，西元1839年6月3日林則徐將所收繳的鴉片在廣東虎門焚燒，共經過了四十幾天才將所有鴉片全部銷毀。	
25	中	吸毒是個人的自由，又沒有拿去賣給別人，沒有人可以干涉我的自由權利了！	錯誤	如果不是因醫生開立的處方籤，或正當理由而持有毒品，那就是違反毒品危害防制條例了。出處：台南市政府106寒假反毒知識學習單-國小高年級	
26	易	在熱鬧的派對中，有許多有趣的人事物正在發生，但是有一些奇怪的飲料罐果出現在桌上，讓野狼刑警覺得大事不妙……小美羊受邀參加派對，看到現場有好多五彩繽紛的特調汽水，但是喝了兩杯後，突然就覺得頭暈暈的，小美羊想說派對現場這麼多人，信旁邊的包廂睡一下，應該沒關係吧！請問，小美羊的想法對嗎？	錯誤	如果在派對中突然覺得身體怪怪的應該趕快離開現場，以免被有心人士下藥利用。出處：搖頭丸濫用猖獗，切莫掉以輕心-I-衛生福利部	
27	易	在熱鬧的派對中，有許多有趣的人事物正在發生，但是有一些奇怪的飲料罐果出現在桌面上，讓野狼刑警覺得大事不妙……在派對上，有人給帥羊羊一顆可以讓他開心跳舞的小藥丸，但是帥羊羊聽說派對上可能有「快樂丸」流竄，所以果斷拒絕！請問帥羊羊的做法對嗎？	正確	可以用於跳舞助興的藥丸、藥片可能是搖頭丸（MDMA），帥羊羊選擇果斷拒絕是很明智的作法。出處：搖頭丸濫用猖獗，切莫掉以輕心-I-衛生福利部	
28	中	使用毒品會導致嚴重的身心傷害，但只影響身體的泌尿系統。	錯誤	使用毒品會導致嚴重的身心傷害，不僅影響身體的泌尿系統，神經、循環系統也會受到傷害。出處：106年寒假親子共學反毒學習單(國小高年級、國中版)	
29	難	大麻常被濫用於幫助減肥，但有眾多副作用，在我國為醫療上禁止使用之藥物。	錯誤	安非他命才是常被濫用在減肥藥當中的毒品，因安非他命屬於中樞神經興奮劑，使用初期會抑制食慾，可能使人短時間內變瘦，但長期使用則可能使人產生幻覺、妄想型精神分裂。	
30	難	哲瑜聽說偶而嘗試毒品不會上癮，且多喝水及牛奶即可迅速地排除毒素，因此偶而跟朋友出去時嘗試毒品是很有義氣的表現，畢竟這樣也不會上癮，不影響生活。請問這樣的想法是對的嗎？	錯誤	不論是長時間或偶爾吸食毒品皆有可能染上毒癮，多喝水或牛奶也無法於短期內排除體內毒素，因此絕對不可輕易嘗試毒品！出處：106年寒假親子共學反毒學習單(國小高年級、國中版)	
31	易	小強幫好朋友保管1公克愷他命(K他命)，在回家途中遭警方查獲，警方告訴他這樣已觸犯——毒品危害防制條例，他將因此被逮捕。請問，警察的說法是否正確？	正確	愷他命(K他命)屬於三級毒品，小強的行為已觸犯毒品防制條例。(補充：違反毒品危害防制條例之行為，需負法律責任，其刑責由重至輕依序為：(一)製造運輸販賣毒品。(二)意圖販賣而持有毒品。(三)強暴脅迫欺騙或非法使人吸食毒品。(四)引誘他人吸食毒品。(五)轉讓毒品。(六)施用毒品。(七)持有毒品。即使是未成年也是有利刑責的！)出處：全國法規資料庫	
32	難	長期吸食愷他命（K他命）後將會導致吸毒者常昏睡，很難叫醒，眼神不集中，精神恍惚、目光呆滯、未感冒但經常流鼻涕、吸鼻水，造成許多生活上的不方便。	正確	吸食愷他命（K他命）會對人體造成十分嚴重的傷害，不僅止於上述所提到的，甚至可能造成膀胱萎縮等無法回流的傷害。參考出處：衛生福利部食品藥物管理署-藥物食品安全週報	
33	中	在久未聯絡的國小同學聚會中，玄雅喝下了墨雅遞過來的飲料後便覺得頭有點昏，此時，玄雅覺得自己大概是不習慣喝酒，因此詢問聚會場所主人的義助家中是否有地方可借她暫時休息。請問她的這個決定是否適當？	錯誤	在覺得自己可能受到藥品威脅時，應心懷戒心，儘快遠離現場，免被有心人士利用。出處：法務部反毒大本營—民眾版	
34	易	轉送毒品給同學「試吃」則屬轉讓行為，並非販售，因此不是犯法的行為。	錯誤	就算只是轉送毒品給他人，持有毒品依然是一種犯法的行為，因此，倘若要避免犯罪，應遠離毒品，健康生活！出處：台南市政府教育局-防治學生藥物濫用專區	
35	難	除離島因毒品不常見，以致於未設置毒品危害防制中心外，全台皆有成立毒品危害防制中心。	錯誤	各縣市政府皆有成立毒品防制中心。出處：106年寒假親子共學反毒學習單(國小高年級、國中版)	
36	中	古柯鹼因可用於局部麻醉、止流鼻血，因此其為合法藥物，可於藥局隨意購買且可任意食用或使用。	錯誤	雖古柯鹼有時會用於醫療用途，但並非民眾可合法輕易購得的藥物。出處：法務部、衛生福利部食品藥物管理署	

37	中	凱勒在路邊撿到一包打開後會散發塑膠味的煙，她認為這包不正常的煙大概是被捲了捲頭丸的粉末。	錯誤	會散發塑膠味的毒品為他他命(K他命)，而非上述提及的捲頭丸，出處：法務部反毒大本營—民眾版
38	難	若被他人強迫吸食毒品時，只能採取堅持拒絕法，以示自己對毒品的排斥及抗拒。	錯誤	若真心想拒絕，無論使用何種拒絕方式皆是可以的，除堅持拒絕外，亦可採取告知理由、自我解嘲、遠離現場、友誼勸服、轉移話題、反駁、反激將等方法拒絕毒品，出處：寒假親子共學反毒學習單(國小高年級、國中版)
39	難	神仙水是約會強暴藥，因為其加在飲料、食物裡幾乎不會被發現，因此若食品、飲品離開視線範圍後，就絕對不要再飲用，才能避免藥物的危害。	正確	神仙水無色無味，又有短暫失憶的副作用，因此是約會強暴藥物之一，出處：管制藥品管理條例及毒品危害防制條例
40	難	阿東發現他最好的朋友小錢已經吸成癮時，由於不想影響他們之間的友誼，因此她決定替他保守秘密，避免其他人知道，以免他因為吸毒而遭懲罰，請問，阿東的選擇是否正確呢？	錯誤	不正確，如若他是真心為他的朋友好，他應為其說明毒品的可怕，並勸導他到醫療院所接受戒治，以免他終生身陷於毒品的泥沼中，出處：寒假親子共學反毒學習單-高中職版
41	中	吸食毒品後若要戒除，僅靠面臨生理上的壓力與磨難，若能克服身體上的不適，就可順利戒除毒品。	錯誤	毒品除了造成身體上對毒品的依賴，用藥後產生的快感才是讓人更難以戒除的心理依賴，出處：衛生福利部食品藥物管理署-藥物食品安全週報
42	易	「不要吃來路不明的食物」是大人經常告誡小孩的話語，因為毒品跟某些藥物經常化身成我們熟知的食品，而我們卻不易察覺。但小朋友不用擔心會吃到毒品，因為毒品絕不會將毒品做成小熊軟糖、奶茶茶包、跳跳糖等等，這種給小朋友吃的糖果。	錯誤	毒販會嘗試各種方法以擴大他的銷售範圍，而這些我們生活周遭極容易取得的食物就成為他們下手的好目標，因為其極容易取得，所以人們對這些食品的戒心便也不會太重，而使他們能較輕易地藉由這樣的包裝來傳播毒品，出處：衛生福利部食品藥物管理署網站(網址： http://www.fda.gov.tw)
43	中	使用毒品不僅只會造成自身身心靈的傷害，更會傷害其家庭甚至危害社會。	正確	吸毒者傷害自己的身體，也會造成父母的心碎，加上吸毒者的精神狀態往往在沉淪下，會連累家人放棄原有的生活來照顧他，甚至需要花費數不清的金錢來幫助他回歸社會，出處：社團法人中華民國解嚴戒毒協會 網址： https://www.hda.com.tw/about/
44	易	藥物濫用者為能夠安全的購買到毒品，常會使用特殊的術語來避免被警方或民眾知悉。	正確	毒品濫用者常使用生活中常見的人、事、物來當作術語，出處：反毒大本營-新興毒品防制專區 網址： https://anti-drug.moi.gov.tw/cp-1187-5930-1.html
45	易	小盟生長在一個健全的家庭中，但在叛逆期的他十分厭惡父母對他課業及生活習慣上的種種要求，因此想做一些叛逆的行為，當同學邀請他吸毒品時，他就爽快的接受了，請問小盟的選擇是否正確呢？	錯誤	健全的家庭生活、健康的人際關係，是遠離毒品的最好方法！而人與人之間的相處、相互關心是人一生中十分重要的一環，因為良好的家庭關係是遠離毒品的保護因子，出處：毒品防制與社會工作-衛生福利部社會及家庭署網址： https://www.sfaa.gov.tw/SFAA/Pages/ashX/File.ashX?FilePath=~/File/Attach/2550/File_2992.pdf
46	難	西西陪爺爺去到廟口參加廟會時，看到路邊攤有賣許多雜牌的餅乾、糖果，雖然這些糖果餅乾都很便宜，但有些包裝不甚完整，這時候西西和爺爺嘴饞，想買下不知名的糖果，請問，這樣的做法正確嗎？	錯誤	現今市面上有不肖商人將大量新興毒品偽裝成零食的模樣在市面上流通，因此在購買品牌表示不清的食品時，人們皆應格外謹慎，出處： https://anti-drug.moi.gov.tw/cp-1191-4737-1.html
47	易	蘇玫瑰被北美洲的原住民用來治療蟲、蛇咬傷，具有「強身、抗毒」的功效，而曾經被引用為反毒花卉。	錯誤	反毒花卉的代表為紫葉蘭，出處： http://enc.moe.edu.tw/
48	易	筱沂想要向暗戀了1年的男生羅銘告白，所以準備了禮物要送他，然而告白當天銘銘卻帶她去參加一場密閉KTV的派對，他的朋友在桌上放了一些點心、飲料，但周圍還散佈著奇怪的白色粉末，請問筱沂是否該為了喜歡的男生繼續留在那個party呢？	錯誤	在不熟悉的密閉場所或是不熟悉的人遞過來的食物、飲料應心存戒心，切勿盲目的信任，若進去的KTV包廂裡有一些奇怪的食物、飲料，請儘快想辦法，找理由讓自己安全離開，出處：學生事務及特殊教育司-防治學生藥物濫用資源網
49	難	快樂丸會使服用者產生興奮、愉快、精力充沛的感覺，而這些感覺並不是負面的，因此快樂丸並不會有負面的影響。	錯誤	快樂丸即為搖頭丸，除上述提及的正面影響外，亦會造成生理上容易出現肌肉緊張、牙關緊咬、流汗、心跳加速、血壓上升、體溫增高、瞳孔擴大、視力模糊、注意力不集中、記憶力差等現象，因此此類毒品亦不可輕易嘗試，否則身體虧空，得不償失，出處：認識新興毒品的危害-高雄市政府立醫院 https://ksgh.kcg.gov.tw/walking04.htm
50	中	萬一我不小心染上毒癮時，應該避免告訴父母，以免造成家裡的負擔，自己找個地方躲起來就好了。	錯誤	藥物成癮的人可能是因為家庭不睦、無法適應社會環境等因素而選擇透過毒品來逃避現實生活，並從中獲得愉快的感覺，如果戒癮，卻無法避免上述的環境阻礙戒癮，那麼戒癮者很容易陷入吸毒—戒癮—吸毒—戒癮的漩渦中，但是若能取得家庭的支持，將會是戒癮的一大助力，參考出處：毒品防制與社會工作-衛生福利部社會及家庭署 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&asrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwin28f59MLkAhUqvYsBHZQoCZ4QFIAAeqQABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.sfaa.gov.tw%2FSAFA%2FPages%2Fashx%2FFile.ashx%3FFilePath%3D-%2FFile%2FAttach%2F2550%2FFile_2992.pdf&usq=AQvVaw3dI9NxcslggutK5mMLtVQ

51	難	一旦成功戒掉毒品後，再犯率是很低的。		錯誤	毒品的成癮性除了讓生理對藥物產生依賴以外，心理也會依賴施用後的那種快感，許多吸毒的累犯者出獄時都已經成功戒毒，沒有戒斷症狀了，但是卻因為現實生活遭遇困境、意志不堅定，而再度主動聯絡藥頭，企圖透過毒品帶來的快感逃避現實生活，但卻讓自己又重回監獄中。	
52	難	甲基安非他命跟安非他命兩者的化學結構相近，兩個都是中樞神經興奮劑。		正確	這兩者都屬於中樞神經興奮劑，服用後都會使人感到精力充沛，則是在掏空自己的精神。	
53	難	FM2是一種很貴的藥物，又稱之為白粉，毒癮者多會透過靜脈注射的方式來施用，但因為針頭取得不易，因此常伴隨著愛滋病、病毒性肝炎等透過血液傳染的疾病發生。		錯誤	上述為海洛因，屬於一級毒品，FM2是一種強力安眠藥，會伴隨記憶力減退的症狀，且無色無味，常被用作偽造毒品藥物。參考出處：毒品之型態與危害 醫事檢驗科 http://web.csh.org.tw/web/a32000/?page_id=366	
54	易	毒品的戒斷症狀只要牙一咬，撐過去就沒事了，因此戒毒並不難。		錯誤	戒斷症狀的痛苦程度並非常人所能想像，若是沒有專業醫療的協助，戒癮者很難獨立戒毒成功。	
55	中	長期施用毒品後，若減少或停止施用毒品，生理上會出現不舒服的症狀，稱為戒斷症狀。		正確	長期施用毒品後，若減少或停止施用毒品，生理上會出現不舒服的症狀，稱為戒斷症狀，例如：肚子痛、全身發癢、打哈欠、流眼淚、流鼻涕，甚至有的會起嚴重的雞皮疙瘩。許多長期施用毒品的人因為無法忍受戒斷時期的痛苦，往往又會再次使用毒品，藉以緩解戒斷症狀，造成越陷越深的惡性循環。	
56	易	如果睡不著的話，可以自己隨便吃家人的安眠藥幫助睡眠。		錯誤	目前安眠藥大多是管制藥品，不能隨便買賣，如果不是醫師開的藥是不能隨便吃的，長期隨便吃安眠藥容易產生依賴性，出現藥物成癮，突然停藥會產生心情不安、吃不下飯及抽搐等戒斷症狀。	
57	易	施用毒品只會對自己的身心健康產生危害，並不會對家庭和社會秩序產生負面影響。		錯誤	施用毒品不只會對自己的身心健康產生危害，也會對家庭和社會秩序產生負面影響，例如：施用毒品者會產生戒癮的效果，用藥量會逐漸增加，因此需要更多錢購買毒品，以滿足自己的需求，就會花光家中的積蓄或是犯下偷竊、搶劫等案件。	
58	中	長期施用毒品後，會產生戒癮的結果，用藥量會逐漸增加，因此需要更多錢購買毒品，往往就會開始販賣毒品，導致刑責更重。		正確	施用毒品者會產生戒癮的結果，用藥量會逐漸增加，因此需要更多錢購買毒品，以滿足自己的需求，往往就會開始販賣毒品，依毒品危害防制條例的規定，販賣毒品的刑責比施用毒品的刑責更重。	
59	中	施用毒品後，所產生的生理依賴性比心理依賴性更難戒除。		錯誤	生理依賴性的意思是，停止施用毒品後，產生戒斷症狀，為了排除戒斷症狀的不舒服，而持續用藥。心理依賴性的意思是，雖然知道使用藥物會對身心造成不好的影響，但對藥物又有強烈的需求和慾望，施用毒品後，所產生的心理依賴性比生理依賴性更難戒除，是因為成癮者需要有意識的拒毒信念和環境的支持，才能避免再次接觸毒品。	
60	中	長期使用某些藥物後，如果只使用原來的劑量，就無法達到原來使用的效果，為了達到和上一次相同的結果，便會需要增加劑量，導致劑量使用逐漸增加。		正確	長期使用某些藥物後，身體內對藥物反應產生改變，如果只使用原來的劑量，無法達到原來使用的效果，為了達到和上一次相同的結果，便會需要增加劑量，導致劑量使用逐漸增加，稱為耐受性。	
61	易	朋友之間應該義氣相挺，所以如果朋友叫我幫忙運送毒品就應該幫助他。		錯誤	運輸毒品的行為會違反毒品危害防制條例的規定，維持朋友間的友誼可以一起做正確的事，例如：一起運動、分享心事、看電影等等，而不是一起做違法的事才是講義氣的朋友。	
62	中	長期使用大麻會產生對周遭事物漠不關心的症狀。		正確	長期使用大麻會產生對周遭事物漠不關心的狀況，也會導致記憶或認知能力降低、不孕症、體重增加等等。	
63	易	吸毒後只要多喝水或打排毒針（打針）就可以將身體內的毒素排出。		錯誤	這些方法只是讓身體的新陳代謝變快，並沒辦法完全排出身體內的毒素。	
64	易	吃安非他命後精神會亢奮，所以精神不好時可以吃安非他命來提神。		錯誤	剛開始使用安非他命的確會有精神變好的感覺，但使用較多次後，這種感覺會逐漸縮短或消失，因此後來使用的量會愈來愈多，每次使用間隔的時間也會愈來愈短，容易出現上癮的結果。	
65	中	在醫學上，絕大多數的毒品是有藥效，可以用來治病的。		正確	例如常聽到的嗎啡，在醫療上會被用來減輕疼痛，大部分的毒品都有醫學上的用途，但是被過度使用會進而產生依賴性和成癮性，為了減少過度使用或不當濫用現象的發生，才會管制人們使用這些東西。	

66	中	因為吸毒是不好的事情，知道身邊的人有吸毒情況時，我應該對他有多遠離多遠，眼不見為淨。		錯誤	如果是家人或朋友有這種情況，除了通報警察局外，也可以告訴學校的師長。裝作沒看到的話，他們的身心狀況會愈來愈糟糕，只有讓他們盡快接受正確的治療，事情才可能慢慢變好。	
67	難	目前吸食強力膠和笑氣（氧化亞氮）不會被依《毒品危害防制條例》處罰。		正確	吸食強力膠和笑氣（氧化亞氮）後，雖然會出現和吸食毒品類似的症狀，但是目前他們並沒有被規定在《毒品危害防制條例》的處罰對象裡面，只能用《社會秩序維護法》處罰。	
68	易	吸食毒品除了對身體不好，要花很多的錢購買毒品、害自己跟朋友家人感情變疏離之外，還會造成社會治安的問題。		正確	吸食毒品除了危害身體外，也會對自己與家人的關係造成不好的影響，甚至導致社會整體治安變差，完全沒有任何優點。	
69	中	朋友拿出毒品要你吸食，並跟你說：如果你不吸你就是沒有義氣，就是不把我當朋友！就算他這樣說，吸毒也是不對的事情，應該嚴肅的拒絕他。		正確	義氣不應該展現在這種會危害自己身體健康的狀況，同樣的如果對方也有把你當成重要的朋友，他就不應該拿你們之間的友情來逼迫你吸毒。另外，大部分的人剛開始接觸毒品往往都是因為好奇心，抱持著「只吸一點點，自己能夠控制自己的這種心態」，最後卻都還是深陷毒品之中。	
70	易	使用毒品得到的快感是一時的，就算持續使用也無法讓我解決現實生活的問題。		正確	使用毒品可以讓你短暫的忘記現實的問題，但是一旦藥效過了，便會發現原本存在的問題還是沒有解決，毒品只是讓人暫時從現實逃避而已。	
71	難	目前台灣管制毒品或藥物濫用防治的成果不是很好，從法律層面來看，原因主要是因為毒品相關犯罪的處罰太輕。		錯誤	目前台灣處罰毒品的法律已經相當嚴格，法律層面上要管制毒品之所以這麼困難的原因主要是因為，毒品的更新速度非常快，要透過法律把新出現的毒品納入處罰的範圍卻往往需要一定的時間，因此會發生查獲新的毒品，卻找不到法律規定可以處罰的情形。吸毒者身心健康問題也並非法律可以解決的問題。	
72	易	懷孕婦女使用海洛因會導致肚子內的胎兒有生長遲緩，甚至子宮內胎兒死亡的狀況。		正確	另外目前沒有明確的實驗結果表示海洛因會導致胎兒畸形，但孕婦所使用的毒品會擴散到胎兒的身體裡，嬰兒一出生就需要面對毒品的戒斷症狀，長大以後更是有發展遲緩、學習障礙...等各種問題浮現。	
73	中	《毒品危害防制條例》第21條第1項規定，當使用毒品者到政府指定的醫療機構尋求治療，醫療機構不用把使用毒品的人送到法院或檢察機關，所以無論幾次，只要我到醫院尋求治療了就不用擔心被警察抓。		錯誤	《毒品危害防制條例》裡面的確有這樣的規定，但是另外也規定了這種情形以一次為限，第一次在醫院治療期間被檢警發現有犯罪的情事時，檢察官會做出不起訴的處分，但僅限一次，一旦再度被發現有犯罪的狀況，便必須受到刑法的處罰。	
74	易	預防勝於治療，尤其一旦染上毒癮便很難戒掉，因此我們應該在平常就多多關心身邊的人。		正確	會吸食毒品的人通常背後都有理由，如果能在他們吸食毒品之前好好關心他們，和他們一起解決問題的話，說不定就可以避免他們走到吸毒這一步。	
75	中	毒品的法定級別是依照：成癮性、濫用性及社會危害性三個指標而分成四級。		正確	相關法律規定在《毒品危害防制條例》第二條，毒品依其成癮性（會癮愈多，否則達不到相同效果）、濫用性（沒有經過醫師處方做正常的服用）及對社會危害性（毒品會引發的社會犯罪問題嚴重度）分為四級。	
76	中	只要把吸毒的人都關起來，就可以解決毒品氾濫的問題了。		錯誤	使用毒品只是毒品犯罪的其中一個部分，其他還有販賣、運輸毒品...等，只要還有一個人想買毒品，賣毒品的人就不會消失，因此要解決毒品氾濫的問題還是必須教育民眾，讓民眾了解毒品的危害，當有一天沒有人要購買毒品時，其他的毒品犯罪便會自然而然消失。	
77	易	請問下面狀況的心態是正確的嗎：聽說小美的爸媽會吸毒，那我不要跟小美當朋友了。		錯誤	每個人都沒辦法選擇自己的父母，出生在這樣的家庭的小孩要面對的困難不是一般人能想像的，因此身為同學的我們應該對他們保持友善並適時的關心他們，否則在學校的人際關係上遭遇挫折可能會讓他們步上父母親的後塵。	
78	易	當急需用錢的時候，販賣或運送毒品可以讓我立刻賺進很多現金，所以是個賺錢的好方法。		錯誤	販賣毒品是毒品相關犯罪裡面處罰最重的一項，而運送毒品同樣也是法律處罰的犯罪，高獲利同時也代表著高風險，除了可能被警察追捕之外也可能被同是販賣毒品的人暗算，所以不管多需要錢都不能夠把販賣及運送毒品當作賺錢的手段，違法的事情絕對不應該做。	
79	中	有任何毒品相關問題都可以撥打0800-770-885向毒品危害防制中心求助。		正確	毒品危害防制中心的專線是24小時的，同時他們也提供輔導、幫忙轉介至醫療院所或輔導機構以及毒品相關問題諮詢的服務，不論是自己或是身邊親友有使用毒品或是相關的問題，都可以撥打專線尋求幫助。	

80	中	想介紹毒品給你的人會把毒品的效果說得很好，甚至告訴你吃那個不會戒癮，或是利用你們之間的感情半強迫式的要讓你吸食毒品，但是他們的最終目的都只有一個：讓你戒癮之後回來找他們買毒品。	https://antidrug.moi.gov.tw/dl-2496-1f38b5a9-7783-4f72-b359-ef9af692dae9.html	正確	很多下游販賣毒品的人自己也是吸毒的人，為了賺更多錢提供自己吸毒，因此會以免費試用為名義誘導未曾使用毒品的人嘗試，等這些人使用過後便會再回來向他們購買毒品，此時就可以用比較高的價位賣給他們，但是這些錢最後還是被他們自己用來買毒品，永遠只能在這個循環中提心吊膽的過日子。	
81	男	當一個人對未來的生活有了目標和理想，就能降低他再次被毒品誘惑的機率。	https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=Zzy0ruSAdYo	正確	在生活中我們多少都會碰到不開心的或不如意的事情，甚至有時覺得自己很孤獨或是找不到生活的意義，這種時候往往毒品就會趁虛而入，但是毒品只能幫你暫時逃避，卻沒辦法解決你真正的問題，只要多多嘗試找到自己的熱情所在，這些問題都會迎刃而解。	
82	中	未成年人如果使用三、四級毒品的話，將會優先適用少年事件處理法進行審理，目的是為了多給他們一次機會改正錯誤行為。		正確	由於青少年年紀還很小，相較於成年人來說還有很長的時間要繼續在社會上生活，並且壞習慣也不是那麼根深蒂固，因此為了讓他們有再次適應社會的機會，青少年與處於風險行為或犯罪將會優先適用少年事件處理法的原則進行教育輔導或審理，處罰的強度會比一般成年人低。	
83	中	使用毒品的人經常會成為社會治安的隱憂，單純是因為吸食、交易毒品這些行為會破壞社會風氣。		錯誤	除了破壞社會風氣，吸食毒品的人可能會受毒品的影響而導致情緒不穩，甚至有時會產生攻擊性的暴力行為，或者因為需要大量金錢購買毒品而出現犯罪行為，因此不論是對他的家人或是對社區的居民的人身或財產都存在著安全疑慮。	
84	男	有抽菸和喝酒或是吃檳榔習慣的人，和沒有這些習慣的人會接觸到毒品的機會是差不多的。		錯誤	有研究顯示有抽菸和喝酒或是吃檳榔習慣的人比起其他人會使用毒品的機率更高，這可能是因為平常有抽菸等習慣的人會出入的場所，認識的人比一般人來得複雜，也可能是因為這群人已經習慣用這種方式來逃避生活中所面臨的壓力或挫折，但這並不代表所有有這些習慣的人最後都會使用毒品。	
85	中	政府如此重視青少年濫用毒品的問題是因為，通常越早開始使用毒品的人，他的犯罪生涯（一生中從事犯罪的時間）也會越長。		正確	曾經使用毒品的人，出獄之後非常容易再度因為毒品相關犯罪又被抓進監獄，如果一個年輕人從十五歲開始使用毒品，可能往後的三、四十年他都會在監獄裡進進出出，幾乎等於白費了整個人生，因此政府才會大力在校園推動反毒，以免大家遺憾終生。	
86	中	科技的進步讓警方可以更容易收集情報，也讓民眾可以更方便接觸到毒品的資訊，因此對於解決毒品氾濫的問題只有正面的效果。		錯誤	科技的進步雖然便利於民眾認識更多關於毒品的危害，但同時有心人士也很容易就能接觸到哪裡有購買毒品的管道、製造毒品的地方等等，因此科技進步對於毒品氾濫的問題來說，同時具有正面和負面的效果。	
87	中	如果在KTV包廂內喝完飲料後，感到頭暈、嘔吐、全身痠軟等不舒服的症狀，應該選擇繼續在KTV包廂休息，等到身體狀況恢復再離開。		錯誤	有些毒品只要少量就可以發生作用或是溶於水中無色無味，時常被加入食物或飲料中，難以用肉眼辨別，導致在無意間就吃到毒品，例如：FM2溶於水中無色無味，因此常被不法人士用來灌迷他人，甚至趁機性侵，因此，如果喝完飲料後，感到不舒服時，要盡快離開現場，並請求協助或是報警。	
88	男	在玩樂的時候，可以使用搖頭丸讓大家更開心，心情不好的時候，也可以使用搖頭丸提振精神。		錯誤	使用藥物後，常常無法控制自我，或是藥效消退後，會感到情緒特別低落，因此使用毒品並不會讓自己更快樂。	
89	中	使用毒品的人大多是從吸煙、喝酒、吃檳榔開始，接著漸進式使用各級管制藥品（毒品）。		正確	有吸菸、喝酒和吃檳榔習慣的人，會比較容易使用毒品，因為他（她）們生活中接觸的人事物，讓他（她）們有較一般人更高的機會接觸到各級的管制藥物（毒品）。	
90	中	搖頭丸是中樞神經興奮劑，屬管制的第二級毒品，常以各種顏色或圖案的藥丸或藥片形式出現。		正確	搖頭丸介紹及各種顏色或圖案的藥丸或藥片。	http://antidrug.moi.gov.tw/cp-25-267-1.html
91	中	強力膠沒有被列為毒品或管制藥品，所以吸食強力膠並沒有違法。		錯誤	雖然強力膠沒有被列為毒品或管制藥品，但是使用強力膠的行為仍然可以依社會秩序維護法加以處罰，所以吸食強力膠仍然是違法行為，強力膠是一種迷幻物質，對大腦有損傷作用。	
92	難	如果發現住家周圍的住宅時常傳出刺鼻的化學性氣味，有可能是隱匿在民宅的製毒工廠，應迅速通報警方。		正確	許多製毒工廠為了躲避警方查緝，時常隱匿在住宅區中，製毒的人往往沒有正確的化學概念，容易發生爆炸、火災等意外，製毒所產生的毒氣和廢棄物也會影響附近居民的健康，若有發現時常散發化學性氣味的民宅，應該通報警方，請警方處理，不要自己擅自進入，以免遇到危險。	
93	男	如果心情不好或想釋放壓力，可以到PUB尋求藥物排除壓力。		錯誤	若是心情不好或是想釋放壓力，可以藉由培養正當興趣、運動、旅遊、唱歌跳舞等方式排除壓力。	

94	中	使用毒品被警察發現後，若是配合警方的調查，告訴警方毒品的來源，而且順利找到販賣毒品的人，可以減刑判責。		正確	根據毒品危害防制條例第十七條的規定，供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。	
95	難	新鮮幫忙運送毒品吸食器具的行為，不會違法。		錯誤	雖然毒品的吸食器具不是毒品，但是根據毒品危害防制條例的規定，運輸毒品吸食器具的行為是違法的。	
96	易	紫錐花運動是要傳達健康、反毒、愛人愛己的觀念。		正確	「紫錐花」是北美印地安人做成敷料來治療蛇、蟲咬傷的植物，近期則被許多公司製成健康食品，因為有「健身」、「抗毒」的意象，因此將紫錐花做為「反毒」的代表花卉，紫錐花運動傳達健康、反毒、愛人愛己的觀念，強調勇敢拒絕毒品，以及勸導周遭的親朋好友不要使用毒品。	
97	中	用一些很恐怖的影片或是聽起來很聳動的標語進行反毒宣導，就可以讓所有人遠離毒品。		錯誤	目前的反毒宣導偏向讓大家一聽到「毒品」便會心生恐懼、厭惡，並且透過人們會遠離自己害怕或討厭的事物的特性來推動反毒政策。但是有時候沒有辦法立刻觀察到使用毒品的危害，所以如果身邊有使用過毒品經驗的人，對他們來說可能反而會讓他們產生懷疑（如：身邊的人使用了一次毒品後身體並沒有明顯變化，反毒的宣導是不是過度誇大了），因而造成反效果。	
98	中	依規定來說，學校發現學生藥物濫用的問題時一定要通報，但是青少年藥物濫用問題難以處理的其中一個原因是，學校萬一發現學生有藥物濫用的情形，為了避免影響學校名譽多會勸導他們轉校，而不會向主管機關通報。		正確	有藥物濫用情形的青少年通常會有成群結隊的特性，因此發現一個學生有藥物濫用的情況時，可能會牽扯出另外一些原本沒被發現但也有使用藥物的人，學校的學生群聚使用毒品對於學校的名譽來說可能受到很大的負面影響，因此有些學校會選擇息事寧人，但是如此一來這些學生將喪失得到幫助的機會，也會使政府的統計資料低估實際的嚴重程度。	
99	中	會染上毒癮的都是成績不好或是身邊沒有什麼朋友的人。		錯誤	這是社會大眾對於吸毒者的刻板印象，但是其實吸毒的人當中也有部分是成績很好或是家庭經濟狀況很富裕的，由此可知我們與毒品的距離並沒有想像中的遙遠，只要稍微一不注意便有可能接觸到它。	
100	易	愛滋病的其中一種傳染方式是在使用毒品的過程中共用針頭。	https://www.youtube.com/watch?v=HMBTYcY5a7g	正確	有些疾病是透過血液或體液傳染的，在使用毒品的過程中如果用了別人用過的針頭，由於針頭上面會有對方的血液或體液，其中的病毒就可能導致後來使用針頭的這個人得到傳染病，如：愛滋病、B型肝炎...等。	
101	中	被稱為強暴丸(FM2)在醫學上是被用來治療失眠的藥物。		正確	FM2屬於中樞神經抑制劑，是屬於一種安眠藥劑，由於作用快、藥效持久，因此有時也會被醫師用於失眠病患的治療，然而由於它也有易溶於水中且無色無味的特性，有心人士會把它拿來在飲料中下藥，迷暈對方且可能進一步性侵害。	
102	難	歐洲的葡萄牙把毒品除罪化（使用毒品的行為不再被當成犯罪）之後，再搭配一些政策的輔助，有效的降低了毒品使用率。		正確	政策的輔助，例如：要打擊的是販賣毒品的人，而認為使用毒品的人是需要幫助的人，政府可能於一些固定地點提供免費的乾淨針頭與針筒，這樣一來也可以降低愛滋病的傳播機率，但是我們還是需要注意，別的國家的做法可以供我們參考，但不一定適合我們直接照搬過來適用，在台灣毒品是否要除罪化仍須審慎評估及考量利弊得失。	

選擇題										
編號	難度	題目	多媒體檔名	選項A	選項B	選項C	選項D	正確答案	詳解	詳解多媒體檔名
1	中	「拉K一時，尿布一世」是懼他命(K他命)對人體造成的影響，以下關於懼他命的敘述，何者「錯誤」？		懼他命為中樞神經抑制劑	施用懼他命會造成視覺模糊、身體失去平衡等症狀	濫用懼他命會導致膀胱壁增厚、容量變小，產生頻尿狀況	長期施用懼他命會造成思覺失調症	D	長期使用而產生思覺失調症的藥品是安非他命，長期使用安非他命會造成妄想、精神分裂症、症狀包括猜忌、妄想、視幻覺、聽幻覺、強迫或重複性的行為、睡眠障礙等等。	
2	難	在月考前，隔壁的同學正在炫耀他吃了聰明藥，這次考試一定會考得很好。實際上，這些藥物主要是用來幫助過動症患者，使其提高注意力，其成分包含安非他命等管制藥品，請問有關聰明藥的敘述，何者正確？		使用聰明藥可以有助於提升學習效率，取得好成績，不會造成負面影響	聰明藥的成分為中樞神經抑制劑	不當使用聰明藥會引起幻覺、心悸、食慾不振等副作用	長期不當的使用並不會產生依賴性	C	一般俗稱的聰明藥，是用來幫助過動症患者，使其提高專注力的處方藥，因此被誤認為可以提升學習效率，取得好成績。市面上的聰明藥有三種：Adderall、利他龍、管他龍，這些的成分都包含中樞神經興奮劑的管制藥品，長期不當使用除了會產生副作用，也會產生依賴性，且會有戒斷症狀。	
3	難	海洛英使用之初會讓人興奮及欣快感，隨之而來的是陷入困倦的狀態，而其戒斷症狀會使身體極端痛苦，使海洛英的使用者以再次施用海洛英的方式，排除戒斷症狀的不適，以下關於海洛英的敘述，何者「錯誤」？		海洛英屬一般毒品，中樞神經興奮劑	海洛英所產生的副作用會感到呼吸抑制、噁心、嘔吐等	施用海洛英會產生高度生理及心理的依賴	停止施用海洛英後，會出現戒斷症狀(冷火雞等)	A	海洛英為中樞神經抑制劑，冷火雞是指身體發冷及起雞皮疙瘩的現象。	
4	易	小歐回國要過海關的時候，碰到有陌生人請他幫忙拿行李過海關，請問小歐應該如何處理比較適當？		自行一貫，幫忙拿陌生人的行李過海關	行李內可能藏有非法物品(例如：毒品)，應該妥為拒絕	向陌生人索取好處，再幫他拿行李	看著陌生人的外表，再決定要不要幫他	B	曾經多次發生，在過海關前有導遊人士假借旅費的費心，讓旅客幫忙提行李過海關，旅客過海關時，被海關重攔行李箱裡藏有毒品，遭移送法辦，因此無論陌生人的身分或外表為何，都應該注意並妥為拒絕陌生人的請求。	
5	中	下列哪些情況是施用毒品後所造成的影響？(複選)		對人體中樞神經系統產生危害	更容易犯下偷竊、搶劫、販毒等案件	與他人建立良好人際關係	影響學習與工作的生活	A&B&D	施用毒品會影響中樞神經系統，並產生生理及心理上的副作用，過量使用會導致生命危險。施用毒品會產生戒斷的效果，用藥量逐漸增加，因此需要更多的金錢購買毒品，以滿足自己的需求。施用毒品也會造成人際的疏離，其精神狀況也會影響工作和學習的表現。	
6	中	小亮最近心情不好，隔壁的同學介紹他快樂丸，並告訴他吃完快樂丸之後，會感到很快樂，請問下列敘述何者正確？		為了眼前的快樂，毫不遲疑地吃下去	雖然不能施用毒品，但是偶爾吃一些快樂丸也不會造成任何負面影響	長期使用快樂丸會心跳加快、運動過度而動機缺乏症狀群	過量使用快樂丸會產生中毒症狀，例如：體溫過高、橫紋肌溶解、急性腎衰竭等等	D	快樂丸就是搖頭丸，即使只是偶爾使用搖頭丸，仍會對身心造成影響，使用搖頭丸後會感到愉悅及活動力亢進，產生其他的副作用，例如：焦慮、誇大妄想、食慾不振、不隨意牙關緊閉等等，過量使用搖頭丸會產生中毒症狀，導致體溫達43度、橫紋肌溶解、急性腎衰竭等等症狀，動機缺乏症狀群通常為使用大麻後所產生的症狀。	
7	中	施用毒品的人平常可能會出現下列哪些特徵？(複選)		食慾不振、體重異常減輕	常上廁所，未感冒卻一直流鼻涕	精神抖擻、氣色很好	成績下滑、逃學逃家	A&B&D	施用毒品的人平常精神恍惚、眼神渙散、朋友圈改變、金錢花費變高、情緒起伏大等異常狀態。	
8	易	下列關於毒品的敘述，何者正確？		朋友都在吸毒，如果我不吸毒就沒有朋友了	玩樂的時候，就需要使用毒品讓自己更開心	避免到是非場所(電動玩具店、網咖、KTV、夜店、PUB等)，降低接觸毒品的機會	拉K或抽K菸不會上癮	C	可以結交沒有吸毒的朋友，並遠離吸毒的朋友，使用藥物後，常常無法控制自我，或是藥效消退後，會感到情緒特別低落，因此使用毒品並不會讓自己更快樂。拉K或抽K菸是會上癮的。	
9	難	下列關於俱樂部用藥的敘述，哪些正確？		俱樂部用藥是指PUB、KTV、網咖等處是非場所中，較容易遭到濫用的藥物	如果心情不好或想釋放壓力，可以到PUB尋求藥物排除壓力	搖頭丸、安非他命、懼他命(K他命)為常見的俱樂部用藥	吸食搖頭丸或安非他命後，會出現暴力、攻擊性行為	A&C&D	若是心情不好或是想釋放壓力，可以藉由培養正向興趣、運動、旅遊、唱歌跳舞等方式排除壓力。	

10	易	以下各種檢驗方式中，哪一種方式可以做為檢驗是否使用毒品的方法？		尿液檢驗	毛髮檢驗	血液檢驗	以上皆是	D	尿液、毛髮及血液是目前常見的檢驗方式，其中以尿液檢驗最常見。	
11	易	如果發現親朋好友有吸毒的情形，可以透過哪些方式幫助他們？(複選)		撥打戒毒成功專線	吸毒不會影響家庭及社會，所以不需要幫助他們也沒關係	找各縣市毒品危害防治中心協助戒除	透過毒品戒治收容機構收容戒毒	A&C&D	吸毒會帶來家庭關係破裂及社會治安不好的問題，可以透過撥打戒毒成功專線 (0800-770-885)，尋求各縣市毒品危害防治中心協助戒除或透過戒治收容機構的收容戒毒，所提供的諮詢服務及就業、就業等資源，幫助吸毒的人戒除毒癮。	
12	中	下列哪些人的行為會觸犯毒品危害防治條例的規定？		琪琪引誘班上的同學使用毒品	阿成將自己手中的安非他命轉讓給朋友	小智持有海洛英	以上皆是	D	引誘他人施用毒品、轉讓或是自己持有毒品的行為，都會違反毒品危害防治條例的規定。	
13	難	FM2時常被不良人士用來加入水或是飲料中，使被害人在無意識間喝下去，導致被害人昏迷，以下有關FM2的敘述，何者「錯誤」？		FM2是強力安眠藥，為中樞神經抑制劑	不當使用FM2後，會感到嗜睡且喪失近期記憶	長期使用FM2會產生頻尿狀況	FM2的戒斷症狀會感到焦慮、注意力不集中、失眠等	C	頻尿狀況是施用毒品(K他命)後，對人體造成的影響，FM2為強力安眠藥，且安眠作用快速，FM2溶入水中無色無味，因此常被不良人士用來昏迷他人，甚至趁機性侵，應盡量避免水或飲料離開自己的視線範圍內，以確保自身的安全。如果不小心喝到加有FM2的水，應盡快離開現場並求救。	
14	中	就讀國二的希希透過朋友的介紹，拿到一包搖頭丸，雖然希希還沒使用搖頭丸，卻在警察臨檢時被發現持有毒品，請問希希持有毒品行為是否違反毒品危害防治條例的規定？		希希的行為有違反	希希的行為沒有違反	只要希希證明自己還沒用過搖頭丸，就不會有罪	希希未滿18歲，所以違反毒品危害防治條例也不會有罪	A	希希持有的搖頭丸屬於目前列管的第二級毒品，根據毒品危害防治條例第十一條規定，「持有第二級毒品者，處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣三萬元以下罰金。」因此持有毒品的行為違反毒品危害防治條例的規定，雖然希希未滿18歲，但也會依少年事件處理法的規定處理。	
15	中	施用中樞神經興奮劑之初，往往會產生興奮感，等到中樞神經興奮劑的藥效消退後，會出現什麼現象？		持續感到興奮	感到疲憊、心情低落	身心更健康	和沒有吸毒的人一樣	B	施用中樞神經興奮劑之初，往往會產生興奮感，等到中樞神經興奮劑的藥效消退後，往往會感受到疲憊、心情低落的狀態。	
16	易	阿廷的朋友拿了一包毒品給他，請問阿廷面對毒品的誘惑可以怎麼做？(複選)	https://www.youtube.com/watch?v=aR0O5WJ13Xw	阿廷：「吸毒會傷害身體，我不要吸毒。」	阿廷：「好啦，我只吸一次就好。」	阿廷：「我等一下有事，先走囉。」	阿廷：「不要吸毒了，我們一起去打球吧！」	A&C&D	只使用一次毒品，就會對身心健康造成傷害，且容易成癮，即使出於好奇心施用毒品，或是在他人的誘惑下，也會忍不住再次施用，因此不能抱持著「只吸一次就沒事」的心態。	
17	難	新興影響精神物質主要是改變傳統毒品的化學結構，透過化學合成的方式避開法律規範的範圍，但使用後也會產生和傳統毒品類似的效果，下列有關新興影響精神物質的敘述，何者正確？		使用新興影響精神物質不會成癮	使用新興影響精神物質不會違反毒品危害防治條例的規定	常包裝成咖啡包、果凍、飲料等形式	對身心健康不會有影響	C	使用新興影響精神物質會產生和毒品類似的效果，因此會影響身心健康和成癮，目前毒品危害防治條例所規範的毒品種類有包含新興影響精神物質，但是新興影響精神物質的變化快速，導致修法的速度無法趕上毒品出現的速度。	
18	難	浴鹽是合成卡西酮類，是新興影響精神物質，浴鹽的結構和作用與搖頭丸、安非他命相似，容易成癮，下列有關浴鹽的敘述，何者「錯誤」？		浴鹽為中樞神經興奮劑	使用浴鹽會產生恐慌、妄想、攻擊性行為等症狀	長期使用浴鹽會有耐受性	使用浴鹽不會違反毒品危害防治條例	D	浴鹽已經列入毒品危害防治條例的規定範圍內，被列為第二級毒品。	

19	中	施用毒品不只影響自己的身心健康，也會影響家庭及社會。下列哪些是毒品對社會的影響？(複選)		學校或工作的適應能力降低	衍伸出偷竊、搶劫等犯罪行為	行為容易危及他人安全	與社會的連結更加緊密	A&B&C	施用毒品的人精神狀況不佳，會缺乏學習興趣或無法融入工作，導致學習或工作能力降低。對周遭危險事物的意識降低，容易從事危險行為，導致自己或他人陷入危險。施用毒品會產生戒斷的效果，用藥量會逐漸增加，因此需要更多錢購買毒品，以滿足自己的需求，就會犯下偷竊、搶劫等案件。施用毒品的人和社會的連結會更加疏離，傾向和其他吸毒的人往來。	
20	易	施用毒品的人會產生什麼現象？		耐受性	生理依賴性	心理依賴性	以上皆是	D	耐受性是指長期使用某些藥物後，身體內對藥物反應產生改變，如果只使用原來的劑量，無法達到原來使用的效果。為了達到和上一次相同的效果，便會需要增加劑量。生理依賴性的意思是，停止施用毒品後，產生戒斷症狀，為了排除戒斷症狀的不舒服，而持續用藥。心理依賴性的意思是，雖然知道使用藥物會對身心造成不好的影響，但對藥物又有強烈的需求和慾望，於是繼續使用。	
21	中	懷孕中的婦女施用毒品，會透過胎盤進入胎兒的體內，導致胎兒也會對毒品成癮。這些剛出生的嬰兒就被稱作毒癮寶寶。以下關於毒癮寶寶的敘述，何者「錯誤」？		容易早產或流產	一出生就有戒斷症狀	導致發育遲緩	只會造成短期的影響	D	懷孕中的婦女施用毒品，所生下的嬰兒可能會有肢體畸形、影響神經系統，長大後也比一般的孩子更容易出現適應不良、攻擊性行為等現象。	
22	難	根據毒品危害防制條例，將毒品分為四級。下列選項中的毒品，何者屬於第二級毒品？		蝴蝶片	愊他命(K他命)	安非他命	海洛英	C	海洛英為第一級毒品、愊他命(K他命)為第三級毒品、蝴蝶片為第四級毒品。	
23	中	如果朋友拿出一包來源不明的糖果要請你吃，你應該怎麼辦？(複選)		和他一起吃	委婉的拒絕他	拿給老師檢查有沒有問題	將拿回家讓家人確認沒問題之後再吃	B&C&D	因為不確定糖果是從哪裡來的，尤其近年來新興毒品偽裝成糖果、餅乾的新聞時有所聞，所以最好先經過老師或家人的檢查，確認沒問題後再吃；如果害怕傷害彼此間的友情也可以委婉的拒絕同學的好意。	
24	中	拉K(吸食K他命)會導致什麼後遺症？	https://www.youtube.com/watch?v=mRSIY5PmXQc	尿失禁	皮膚潰爛	性格暴躁易怒	產生暴力行為	A	吸食K他命會導致膀胱變厚，膀胱變厚後的膀胱容量變小，無法容納正常的尿量，便會因此產生尿失禁的情形。	
25	中	常見濫用藥物依照毒品特性共分成五大類。請問下列何者不是其中之一？		中樞神經抑制劑	中樞神經興奮劑	中樞神經迷幻劑	注射性濫用物質	D	依衛生福利部食品藥物管理署之分類，常見濫用藥物分成：中樞神經抑制劑、中樞神經興奮劑、中樞神經迷幻劑、吸入性濫用物質及新興影響精神物質，共五大類。	
26	易	近年來大量流行的新興毒品會偽裝成什麼型態吸引青少年吸食？(複選)		即溶飲料	糖果	小包速食麵	巧克力	A&B&C&D	請參考新聞內彰化縣警局展出新興毒品的可能型態。 https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2135535	
27	易	毒品依照哪些指標的嚴重程度而分成四級？		成癮性	身體危害性	社會危害性	濫用性	A&C&D	《毒品危害防制條例》第二條，毒品依其成癮性、濫用性及對社會危害性分為四級。	

28	中	如果發現親友有藥物濫用的狀況，可以撥打以下哪個專線呢？		0800-770885(請請你幫幫我)	0800-788-995(請幫幫我救救我)	0800-013-999	0800-231-161	A	容易混淆的選項C為自殺防治專線。B為自殺防治專線。戒癮成功專線的號碼是選項A(請請你幫幫我)。	
29	中	外表神似冰糖，因而有冰糖、冰塊俗名的毒品是下列哪一項？		搖頭丸	攪他命(K他命)	安非他命	FM2	C	圖為安非他命的結晶型態。	Jc29.png
30	易	請問圖中色彩繽紛，並有許多圖案，乍看和一般糖果沒有兩樣的是哪一種毒品？	Jc30.png	喵喵(4-甲基甲基卡西酮)	MDMA	安非他命	FM2	B	搖頭丸又名MDMA，以顯色、圖案多樣為大眾所知，但也因此非常不容易辨識，除了錠劑有時也會以膠囊或粉末的模式出現。	
31	難	萬一不小心喝到摻有大麻的飲料，會產生什麼生理反應？(複選)		眼睛發紅 產生幻覺 頭腦變清楚	心跳加快	產生幻覺	頭腦變清楚	A&B&C	大麻吸食後會產生幻覺、妄想、口乾、眼睛發紅和心跳加快等現象。長期使用更會產生耐受性及心理依賴性。	
32	易	下列大麻對人體的危害，請問哪些是正確的？(複選)		懷孕婦女吸食大麻會造成早產	長期使用會出現妄想型精神分裂症	青少年時期使用大麻會造成智力商數(IQ)下降	吸食後會造成短期的記憶喪失	A&C	長期使用後出現妄想型精神分裂症是吸食安非他命的後遺症，另外目前並未發現吸食大麻會造成短期的記憶喪失，因此BD都不是吸食大麻會產生的危害。	
33	中	毒品滲透你的生活之中，如果要遠離毒品的侵害，什麼樣的想法是不正確的？		要盡量避免出入可能會接觸到毒品的場所(如：網咖)	提高警覺性，不隨便接受陌生人給的食物或飲料	遇到壓力時可以透過運動的方式來紓壓	我只是嘗試一次，沒有那麼容易上癮的啦	D	毒品成癮可以分為心理和生理兩個層面，生理層面於戒除毒品時會產生戒斷症狀，身體會非常不舒服；心理層面則是會對毒品產生一種依賴感。大部分人難以戒除毒品是因為心理無法擺脫對毒品的依賴，一旦有過一次透過毒品逃避現實的經驗，便會有第二次、第三次，因此千萬不能抱持著僥倖的心態。	
34	難	哪一種毒品在常溫下無色無味，吸入約15到30秒即可產生欣快感，並可持續2到3分鐘，長期使用會影響活性維生素B12的生成，進而影響血液及神經系統功能，但目前卻未被列在《毒品危害防制條例》的處罰範圍內？		古柯鹼	笑氣(氧化亞氮)	海洛因	強力膠	B	笑氣(氧化亞氮)長期使用會產生末梢神經及骨質病變，出現手麻、腳麻、無力走路、立體感完全喪失等症狀，目前濫用者只能依據違反社會秩序維護法第68條處3日以下拘留或新臺幣1萬8千元以下罰鍰。	
35	易	吸毒除了傷害自己的身體，還會對生活造成什麼影響？		影響家庭氣氛、經濟狀況	自己的人際關係會變得更糟	同學會更崇拜自己	吸毒是我自己的事情，不會對其他人造成影響	A	毒品犯罪也被稱為「無被害者犯罪」，因為在毒品犯罪中通常不會出現一個直接因為你吸毒而受到傷害的對象，但不會直接受害不代表吸毒的行為不會影響其他人的生活，尤其家人是接觸最頻繁的人，對他們造成的壓力及困擾不言而喻，特別是對吸毒者子女的傷害更是不在話下。	
36	易	如果在學校的課業上遭遇挫折，怎麼樣都達不到理想的成績時，以下哪個是不好的做法？		找老師尋求協助	和家人討論	跟朋友聊天放鬆心情	出入可能會碰到毒品的派對抒發壓力	D	學校的課業成績不代表一切，不過當心情不好時和可以讓你放鬆的人談談可能對你有幫助。抒發壓力也有很多方式，例如：適當的電玩、看動漫、電視劇、運動、唱歌等等。出入娛樂場所可能會增加自己接觸到毒品的機率，應該盡量避免。	
37	易	如果遇到朋友拿出毒品要你吸食，並跟你說：如果你不吸你就是沒有義氣，就是不把我當朋友！這種情況應該怎麼辦？		為了展現自己的義氣，和朋友一起吸食	為了保護兩人的友情，於是順從對方	嘗試告訴他吸毒的壞處，並讓他知道你希望他能健康	只吸一點點，這樣既可以保護友情又可以滿足自己的好奇心	C	義氣不應該展現成這種會危害自己身體健康的情況，同樣的如果對方也有把你當成重要的朋友，他就不應該拿你們之間的友情來逼迫你吸毒。另外，大部分的人剛開始接觸毒品往往都是因為好奇心，抱持著「只吸一點點，自己能夠控制自己的這種心態」，最後卻都還是深陷毒品之中。	

38	難	請問毒癮的吸食方式是什麼？	https://www.youtube.com/watch?v=PHNg18YBPpY	吸食煙癮之後產生的煙霧	把毒癮藥泡在水裡之後再喝下去	用針頭進行注射	用菸的或含在嘴巴中使用	D	就像影片內達到的，毒癮藥主要的吸食方式是用舌頭舔，之所以用這個方式是因為毒癮藥的藥物成分在菸葉面混合了藥物和糯米膠的塗料（就像一般菸葉面乾燥的膠水）。另外最近也出現了將菸用糯米紙製成的毒癮藥，將它含在嘴巴不僅可以吸食到毒品，糯米紙也會融於口中不易留下證據。
39	難	從法律層面來看，管制毒品的困難之處主要是什麼？		毒品相關犯罪的處罰太輕	毒品相關犯罪的處罰太重	毒品的分級沒有明確的標準	立法速度遠遠跟不上新的毒品出現的速度	D	毒品的更新速度非常快，通常改變化學結構就變成另一種新的毒品，而相對通過立法程序將一項毒品規範到法律管制裡面需要一段時間，因此經常發生查獲新的毒品卻找不到法律依據可以處罰的情形，或者政府尚未將那些毒品列管的狀況。
40	易	假如你有吸癮成癮的行為，你想把毒癮戒除，但是又害怕會被警察抓，這時該怎麼辦？		自己默默想辦法，想不到就算了	到衛生福利部指定醫療機構尋求協助	和販賣給你毒品的朋友商量	去參加義訓把這個煩惱拋到腦後	B	依《毒品危害防制條例》第21條第1項規定，如果施用毒品者到機構請求治療，機構不用通報法院或檢察機關，因此如果是因為害怕受罰而不尋求協助，在醫療機構這方面可以不用擔心自己使用毒品的情形被通報。
41	易	從前阿三深受毒癮所苦，在醫療機構的幫助下，他好不容易成功戒了毒。請問怎麼做有助於阿三回歸日常生活？		遠離他，盡量不和他有接觸	幫助他建立正確價值觀	幫助他尋找工作，他才能自給自足	不帶著有色眼光和他相處	A	對使用毒品的人來說，戒毒是非常困難的一個過程，但在戒毒之後還有一條更艱辛的道路在等著他們，那就是回歸社會，回到日常生活。社會大眾不應該用歧視的眼光看待他們，而是把他們當作一般人正常相處，並給予他們所需要的社會支持（包括就業及生活），讓他們了解過去的事情都已經過去了，只要他願意就能重新開始的機會。
42	中	阿志為了玩電腦進哥哥的房間，進去之後發現桌子上散落了一些白色的粉末，而且空氣中有燃燒的塑膠味，因此他懷疑哥哥應該是吸了毒。請問阿志用什麼態度來面對哥哥是最好的？		為了不要讓哥哥被爸媽罵，幫他把桌子擦乾淨，把窗戶打開通風	覺得哥哥怎麼可以做出這麼丟臉的事情，開始對哥哥不理不睬	提醒哥哥說毒品不好，告訴他在犯罪被重罰之前到指定的醫療機構尋求治療是不會被抓的，勸他去接受治療	認為哥哥活該，趁這個機會告訴爸媽，讓他們好好「教訓」哥哥一頓	C	面對家人吸毒時，親人的陪伴與支持對他們來說非常重要，如果生活中沒有遇到什麼問題的話，沒有人會想去吸癮的。這時候一味地指責、打罵都毫無補益，因此家人應該比平常更關心他們，改善家人和他們之間的關係慢慢打開他們的心防，再進一步勸他們到醫療機構接受治療。
43	中	如果父母有使用毒品的狀況，會對小孩產生什麼不好的影響？（複選）		將金錢都拿來購買毒品而無法滿足小孩生活基本需求	讓小孩以為使用毒品很平常，對他們的價值觀造成不好的影響	經常疏遠其他場所，無法好好照顧小孩，造成彼此的疏離	因為使用毒品的關係認識了許多人，可以增廣小孩的見聞	A&B&C	家庭是人類一生直接接觸到的環境，對於人格的養成有極大的影響，父母親吸毒對小孩的影響遠遠超過想像，尤其容易產生不當管教的情況，加上從小看著他們吸癮有樣學樣，最後很多小孩也會步上父母親使用毒品的後塵。
44	中	父母應該做到那些事情，就可以降低小孩接觸毒品的機會？（複選）		增進自己對毒品的知識	直接命令小孩要順從大人的想法	讓小孩多元發展，培養各種小孩想從事興趣	關心小孩在學校發生的事情和交友狀況	A&C&D	家庭是避免小孩接觸到毒品的一道防線，如果父母親關心小孩的身體和心理狀況及學校生活，並隨時傾聽他們，和他們溝通對話，將能有效降低彼此之間的隔閡，並提升親子間的親密度；培養小孩的多元興趣不僅可以幫助其發現自己的興趣所在，也能讓他們的休閒生活有個重心，避免出入複雜場所或誤交損友。
45	易	毒品在許多方面都會造成危害，請問下列何者為非？		製造毒品的工廠可能會排放廢水，汙染環境	可以利用毒品擴展自己的人際關係	影響吸癮者家人的生活	對吸癮的人本身健康有負面影響	B	利用毒品擴展的人際關係只是建立在互相利用的基礎上而已，因此這種關係是非常脆弱的，甚至可能會彼此出賣，如果想要有健康的人際關係應該多參加其他有益身心健康的正當活動去認識新朋友。
46	中	當發現朋友有吸癮的狀況時，可以用那些心態或作法來面對他？（複選）		在他背後說壞話，叫別人排擠他	和他保持適當距離，但也不要惡意疏遠他	在他心情不好的時候關心他	告訴他遇到困難的時候可以尋求別人的幫忙	B&C&D	發現朋友有吸癮的情況時，有不知所措的反應是正常的，不實是為了避免自己也接觸到毒品而決定與他保持距離，或是覺得應該要更關心他，都是正確的心態，但排擠他只會造成彼此的距離越來越遠，對於希望他不要吸癮沒有幫助。

47	難	使用甲基安非他命後，可能會對人體產生什麼影響？（複選）		妄思皮膚下有蟲在爬而抓傷皮膚	食慾增加	提高對其他人的同理心	對牙齒造成損害	A&D	使用甲基安非他命之後會導致食慾下降，因此許多減肥藥的不肖業者會將其作為減肥藥的其中一個成分，長期吸安的人牙齒通常會損壞，因為牙齒會變鬆；提高對人的同理心則是使用搖頭丸後會暫時出現的現象。	
48	中	毒品推陳出新，近年來大量氾濫的新興毒品有以下什麼特點？		跟其他的毒品相較之下對身體的危害較輕微	每一包內含的劑量都差不多	比起一般毒品對身體的危害更嚴重	內容物的成分單純	C	新興毒品通常由多種成分混合製成，因此每個包裝的劑量也都不盡相同，在交互作用之下更會對人體造成更大的危害，另外雖然仔細看的話還是能從包裝看出一點端倪，但對於年紀較小的少年與孩童，就沒有經驗的人來說，可能難以辨識和一般包裝的差別，因此，在社交場合他人提供的包裝咖啡包、糖果或梅子粉，要謹慎避免使用。 同，在交互作用之下更會對人體造成更大的危害，另外雖然仔細看的話還是能從包裝看出一點端倪，但對於年紀較小的少年與孩童，或沒有經驗的人來說，可能難以辨識和一般包裝的差別，因此，在社交場合他人提供的咖啡包、糖果或梅子粉，要謹慎避免使用。	
49	難	在藥物戒癮治療中，可以透過藥物治療減輕戒斷時的不舒服，下列有關藥物治療的說明，何者「錯誤」？		可以改變停止使用毒品所產生的震鬱、疲倦、失眠等症狀	部分毒品可以透過藥物治療降低想要使用的慾望	只依靠藥物治療就能完全戒除毒品	可以處理藥物戒癮所產生的生理疾病或精神疾病	C	部分毒品可以透過藥物治療降低想要使用的慾望，但並不代表可以絕對不去使用毒品，只依靠藥物治療是難以完全戒除毒品的，因此必須配合心理治療、生活重建等其他方式。	
50	易	下列有關毒品的敘述，何者「錯誤」？		使用毒品的人大多是從吸煙、喝酒、吃檳榔，而後使用毒品的漸進式發展	偶爾使用一次毒品也會成癮	使用毒品只會影響自己，對家庭不會有影響	使用毒品會影響大腦	C	施用毒品不只會對自己的身心健康產生危害，也會對家庭產生負面影響，例如：施用毒品的人會產生戒癮的效果，用藥量會逐漸增加，因此需要更多錢購買毒品，以滿足自己的需求，就會花光家中的積蓄，或是對家人間的互動產生負面影響。	
51	中	使用毒品不只會影響個人的身心健康，也會對家庭造成影響，下列哪些選項是使用毒品對家庭可能造成的影響？（複選）		家庭氣氛和樂趣	懷孕時使用毒品，會使生產風險提高，也會影響胎兒	施用毒品的父母對子女照顧不周，甚至引發家庭暴力及虐待兒童的情形	家庭內互動關係不良	B&C&D	懷孕時使用毒品，會使生產風險提高，也會影響胎兒，所生下的嬰兒可能會有肢體畸形、影響神經系統，長大後也比一般的孩子更容易出現適應不良、攻擊性行為等現象，施用毒品的父母可能有經濟問題或是人際，而對子女的照顧不周，導致家庭暴力及虐待兒童的情形，在家庭中施用毒品的人，會面對就學不穩定、經濟困難、精神健康等問題，面對家庭中有人施用毒品，其他家庭成員會感到羞愧，或是對於協助戒癮感到無力，許多因素間互相影響，導致家庭內的互動關係不良，常會爭吵。	
52	中	吸食大麻會降低判斷距離和速度的能力，及反應時間減慢，常導致交通事故等公共危險的發生，下列有關大麻的敘述，何者正確？		大麻是中樞神經興奮劑	吸食大麻後，不會產生妄想或幻覺的症狀	在青少年時期，使用大麻會導致IQ下降，學習及記憶能力降低	懷孕時使用大麻，對胎兒不會有任何影響	C	大麻是中樞神經迷幻劑，使用後會產生妄想、幻覺，造成知覺異常，容易發生危險，在青少年時期，使用大麻會導致IQ下降，學習及記憶能力降低，若是在懷孕期間使用大麻，則會導致早產、胎兒體重偏低。	
53	易	婷婷發現班上有同學在吸食不明的白色粉末，時常精神恍惚且十分嗜睡，還發現同學間會互相交換不明的白色粉末和藥丸，婷婷遇到這種情形應該如何處理？		幫同學隱瞞，不要告訴任何人	跟同學拿一包粉末試試看	假裝沒看到，因為使用毒品不會影響其他人	告訴學校的老師	D	使用毒品不只會對自己的身心健康產生危害，也會對學校、家庭及社會產生負面影響，同儕間容易因為朋友的誘惑而使用毒品，導致學習能力降低、出現偏差行為、生活適應能力降低等情形。	

54	男	小張考試壓力大，晚上時常失眠，他在網路上發現「新的FM2減丸，可快速睡覺」的廣告，請問小張「不」應該怎麼做？		毫不遲疑的直接購買	搜尋和FM2有關的資料	檢查訊息的來源是否可靠，例如：是否為政府機關提供的資訊	拒絕接受可疑的廣告	A	網路訊息、廣告不一定完全正確，因此身為網路的使用者在面對網路資料的時候，應該先判斷訊息的正確性，以免受害。FM2是強力安眠藥，為中樞神經抑制劑，不當使用FM2後，會對睡眠造成影響，如：記憶力不集中、失眠等等。若有失眠的問題，應該尋求專業人士協助。	
55	難	他他命(K他命)為中樞神經抑制劑，在藥理上作為麻醉使用，濫用他他命會產生感官與現實完全脫離的感受，大量使用他他命或與其他毒品一起使用，容易引起急性中毒，也會對身體其他器官產生影響，下列哪些是使用他他命可能出現的症狀？(複選)		辨識周圍環境的危險及覺性降低	膀胱疼痛、頻尿、解尿困難	影響腎臟功能	血壓下降	ABC	他他命(K他命)為中樞神經抑制劑，濫用他他命會產生感官與現實完全脫離的感受，導致辨識周圍環境的危險及覺性降低，在急性中毒的情形下，容易發生意外事故，施用他他命會造成視覺模糊、身體失去平衡等症狀，且會導致膀胱壁增厚，容量變小，產生頻尿狀況，膀胱縮小導致腎臟的尿液無法進入膀胱，造成腎臟病變，使用他他命後會導致心跳過快、血壓上升。	
56	中	使用毒品不只是涉及犯罪問題，也會影響個人身心健康，因此可以透過醫療單位進一步評估吸毒後的身心狀況及家庭問題，何者是醫療單位所提供的協助？		驗尿檢測用藥情形	住院戒癮治療	家庭諮商與家族治療	以上皆是	D	透過醫療單位評估使用何種毒品及有無引起其他精神疾病，與醫療單位及醫院社工合作，並配合醫療監測計畫，增加不使用毒品能力。	
57	中	有些毒品只要少量就可以發生作用或是溶於水中無色無味，時常被加入食物或飲料中，難以用肉眼辨識，導致在無意間就吃到毒品，下列哪些方法可以避免誤食毒品而受害的情形發生？(複選)		遠離是非場所(KTV、網咖、PUB)	不接受陌生人的飲料、香菸	若誤食毒品而發生異狀，應立即離開並求助	熟悉的人給的飲料不需要懷疑，可以直接喝	A&B&C	許多透過安眠藥而犯案的情形，常發生在認識的人之間，因為對熟悉的人容易降低戒心，而使加害人得逞。	
58	難	在美國有一名使用浴鹽的男子，在路上攻擊流浪漢，目前浴鹽已被列入毒品危害防制條例，請問浴鹽屬於第幾級毒品？		第一級毒品	第二級毒品	第三級毒品	第四級毒品	B	浴鹽是合成卡西酮類，是新興影響精神物質，浴鹽的結構和作用與搖頭丸、安非他命相似，容易成癮，為中樞神經興奮劑，使用浴鹽會產生恐慌、妄想、攻擊性行為等症狀，長期使用浴鹽會有耐受性，浴鹽已經列入毒品危害防制條例的規定範圍內，被列為第二級毒品。	
59	難	英國有位青少年在使用嗑嗑一段時間後，開始產生幻覺，誤以為有蟲在啃蝕他的身體，甚至將自己的睾丸扯下，嗑嗑是新興影響精神的物質，屬於合成卡西酮類，會產生和安非他命類似的作用，下列有關嗑嗑的敘述，何者正確？		嗑嗑是中樞神經抑制劑	合成卡西酮類的毒品不具有成癮性	使用後，可能會出現妄想、幻覺、興奮、暴力的行為	目前尚未列入毒品危害防制條例的範圍內	C	嗑嗑是中樞神經興奮劑，屬於合成卡西酮類，具有強烈的成癮性，會產生心悸及血壓升高的情形，目前已列入毒品危害防制條例中，為第三級毒品。	
60	中	使用毒品的人在回歸社會後，往往會遭遇一些困難，何者是吸毒者會遇到的困難？		使用毒品所造成的傷害，影響日常生活	學業中斷，求職機會受限	再次接觸到曾經一起吸毒的朋友	以上皆是	D	使用毒品所造成的傷害，會影響日常生活，例如：他他命(K他命)會導致膀胱及膀胱內黏膜硬化，使膀胱容量縮小，甚至有部分的人需要終身包尿布。其次，使用毒品的人在回歸社會後，往往會再次回到原先生活的環境，就有可能接觸到曾經一起吸毒的朋友，而再次使用毒品，他(她)們在求學和求職的歷程也會受限很大。	
61	中	中樞神經迷幻劑可以讓使用毒品的人產生與現實脫離的感受，或產生視覺與聽覺上的幻覺，請問長期使用迷幻劑會產生什麼影響？(複選)		具有充分的想像力	記憶能力受損	精神渙散，難以集中	積極向上	B&C	長期使用迷幻劑會導致記憶能力受損、精神渙散、產生幻覺，常會導致意外和公共危險。	
62	男	如果心情難過或是考試壓力大，怎麼抒發壓力可以有益身心健康？(複選)		使用毒品	運動	抽菸、喝酒	培養正當興趣	B&D	使用毒品、抽菸、喝酒都會傷害身心健康，若是心情不好時，可以從事戶外運動、培養正當興趣與休閒、跳舞或唱歌等方式抒發壓力。	

63	難	使用毒品的人在回歸社會後，往往會再次回到原先生活的環境，就有可能接觸到曾經一起吸毒的朋友，而再次使用毒品。下列哪些方法可以幫助他們避免再次接觸毒品？（複選）		吸毒對社會不會有任何影響，所以不需要幫助他們	要盡量停止使用毒品後，所產生的戒斷症狀治療	透過心理戒治，降低心理對毒品的依賴	安排職業訓練、生涯規劃，人際關係及價值觀的導正	B&C&D	吸毒會影響社會環境和治安，讓社會出現很多不安寧的狀況，影響層面很廣。因此，面對使用毒品的人時，當他（她）們結束戒治或監禁後在回歸社會的時候，我們提供所需要協助，可幫助他們更加堅定戒毒的決心，回歸社會，避免再次使用毒品。	
64	中	使用大麻的初期會產生興奮、注意力敏銳的感覺，劑量增加後會感受到幻覺、猜疑、感覺扭曲等症狀。下列關於大麻的敘述，何者「錯誤」？		大麻又稱為可卡因、快克	使用過量會產生胡言亂語、呼吸麻痺，甚至導致死亡	停止使用不會產生戒斷症狀	古柯鹼為第一級毒品	C	停止使用大麻會產生憂鬱及渴求藥物的感受，渴求藥物的感受會轉變為全身疲勞、過度進食及快感缺乏。	
65	中	GHB容易加入飲料中，因此常被不良人士用來昏迷他人，甚至趁機性侵。下列關於GHB的敘述，何者「錯誤」？		GHB是液態快樂丸	GHB是中樞神經抑制劑	被列為第二級毒品	使用GHB會感到提神	D	使用GHB後，會感到暈眩及昏眩等症狀。	
66	易	許多新興毒品常包裝成咖啡包、餅乾、糖果的型態，下列哪些可能是包裝新興毒品的陷阱？		包裝有折封及重複包裝的痕跡	密封過的飲料	自創卡通圖案或特殊造型的包裝	以上皆是	D	新興毒品的各項包裝	https://www.youtube.com/watch?v=aXn81_9Suq0
67	中	有關毒品的相關法律規範，哪些敘述是「錯誤」的？（複選）		製造、運輸、販賣毒品的刑責比持有毒品重	持有一級毒品的刑責比持有第四級毒品重	小明把毒品免費送給同學的行為沒有違法	未滿18歲的人使用毒品不會違法	C&D	免費提供毒品給其他人的行為，在毒品危害防制條例上屬於「轉讓」的行為，會違反毒品危害防制條例的規定。雖然未滿18歲，但會依少年事件處理法的規定處理。	
68	中	「忘我」是中樞神經興奮劑，常以各種顏色或圖案的藥丸出現，請問我下列何種毒品？		安非他命	搖頭丸	愾他命（K他命）	大麻	B	忘我就是搖頭丸，是中樞神經興奮劑，常以各種顏色或圖案的藥丸出現。	
69	中	下列敘述，哪一項是正確的？		毒品就像香菸，只吸一口不會怎樣。	吸食愾他命對身體造成的影響是可以透過藥物治療的。	毒品對腦部幾乎不會造成危害。	青少年使用毒品原因有很大部分原因是朋友的慫恿。	D	(A)「毒品吸一次不會上癮」通常都是騙人的話術，讓你不知不覺對毒品產生依賴。(B)毒品對身體的傷害有些是不可逆的，像長期吸食愾他命會使膀胱纖維化，永久無法恢復，目前沒有藥物可以治療。(C)毒品對於腦部傷害非常巨大，例如長期使用搖頭丸會使腦中神經退化。	
70	易	哪些方式無法能幫助青少年遠離毒品？		培養良好的嗜好	規律作息	遠離人群，壓抑情緒	良好的情緒發洩技巧	C	生活中遭遇挫折或感到情緒低落時，青少年較容易藉由非法藥物的使用達到減輕壓力、尋求刺激或舒緩情緒等目的。	
71	難	濫用藥物依據其藥理作用可分為三大類，分別為哪三大類？		抑制劑、興奮劑、維持劑	抑制劑、興奮劑、迷幻劑	安眠劑、興奮劑、維持劑	安眠劑、維持劑、迷幻劑	B	濫用藥物依據其藥理特性可分為中樞神經抑制劑、興奮劑及迷幻劑。	

72	易	學校能為青少年階段的你/你哪些協助？		輔導課程	轉介諮商中心	藥物濫用諮詢	以上皆是	D	學校可以提供青少年多種服務，包含輔導課程、原液篩檢、告知法律義務和轉介服務等。	
73	易	若得知最好的朋友染上毒癮，應該以何種態度面對？		就算吸毒，還是最好的朋友，應陪他一起吸毒。	當作沒看到。	尋求學校老師的協助。	答應他幫他保密。	C	學校有提供很多資源幫助青少年遠離毒品。多元化的輔導方式，透過心理輔導、團體輔導、志工陪伴、替代療法及團體運動等，最大效能的幫助青少年遠離毒品。	
74	中	以下哪一種行為不屬於藥物濫用？		不是基於醫療的需要而使用成癮藥物。	未依醫師處方使用藥物。	基於醫療需要，依照醫生指示使用藥品。	用藥程度遠傷害個人健康及社會安全的程度。	C	藥物濫用的定義為：非醫療用途或未經醫師同意，不當或過度使用成癮物質。	
75	易	下列敘述哪些可能是毒癮者的特徵？		身體有燒塑膠的味道	精神恍惚，目光遲滯	情緒變化大	以上皆是	D	吸毒者常有特徵包括：作息改變、日夜顛倒、食慾不振、課業成績下滑、精神恍惚、目光遲滯、情緒障礙、憂鬱異常、常跑廁所(催他命)、有燒塑膠味道及體重異常減輕等。	
76	易	下列哪一項對於毒品的態度較正確？		作樂時使用藥物是助興的方法之一。	若朋友推薦藥物，一定要情義相挺陪他一起使用。	不能為了好奇而使用毒品。	現在還年輕，不嘗試以後就沒機會了。	C	(A)在無效失去後會感到失落感，不能因一時快樂而使用。(B)應避免與吸毒的朋友交往，遠離毒品。(D)毒品一次都不能嘗試。	
77	易	阿修成績一直很差，又跟家人感情失睦，小賢為了鼓勵他打起精神，拿了一包似乎重新包裝過的咖啡粉給阿修，並和 <u>阿修</u> 說可以提神，請問面對這個情況， <u>阿修</u> 應該抱持什麼態度及反應？		非常感謝小賢，在半信半疑的態度下使用咖啡包。	堅定拒絕，避免嘗試任何可能是毒品的東西。	不可能是毒品，就吃吧！	因為是別人的心意，就先收下帶回家，可泡可不泡。	B	新與毒品包裝多樣，若有任何疑慮，即便是最好的朋友給的，也不能相信，要堅定地拒絕使用。	
78	難	下列對於催他命的敘述何者錯誤？		長期使用會傷害膀胱。	會讓使用者產生「狂喜」的感覺，並且副作用不大。	濫用會使腦部功能受損。	是新興影響精神物質中濫用最多的藥物之一。	B	催他命對人體造成影響有焦慮、煩躁不安、失去方向感、失眠等副作用。	
79	難	下列對於安非他命的敘述何者錯誤？		會讓使用者嗜睡。	容易產生幻覺，衍生效序行為。	副作用包括肝臟受損及心臟衰竭，過量吸食可能會造成死亡。	通常與甲基安非他命共用俗名，又稱冰塊、安仔及冰毒。	A	安非他命屬於中樞神經興奮劑，會提高身體活動力、產生幻覺、降低食慾、增加欣快感。	
80	難	俗稱快樂丸，屬於中樞神經興奮劑，其副作用會用藥者體溫升高出現高溫症候群的是哪一種濫用藥物？		海洛因	一粒眼	搖頭丸	嗎啡	C	搖頭丸又稱MDMA、狂喜、快樂丸、忘我即綠錫類，具有興奮作用，使用後會使體溫升高，若處在不通風的環境容易出現熱衰竭。其副作用對於心臟、肝神經及大腦都有傷害。	
81	易	有一天去好朋友家，他拿給你一包標示不明的咖啡包跟你說：「這裡面裝的是好東西，可以讓身心放鬆，你要不要試試？」，此時該如何回應他最佳？		你喝我就喝	不行，我今天身體不舒服，真的不想用。	我就只試這一次囉，以後別再給我了。	讓我考慮一下，要用再找你拿。	B	可和對方說明理由並用堅定的口語拒絕對方(堅持拒絕法)。回答不要模稜兩可，或是為了好朋友而使用毒品。	

82	難	下列關於新興影響精神物質(New Psychoactive Substances, NPS)的敘述何者錯誤？		容易變裝，不易察覺。	多是合成的化學藥物。	時常多種藥物混合使用。	大部分藥效強，但不易戒癮。	D	新興毒品為躲避警方查緝，多會摻雜在軟糖、咖啡包等偽裝食品當中，不易被察覺，且混雜在軟糖、咖啡包中的毒品，往往為了使藥效更強及成癮性更強，而添加多種的藥物在其中。	
83	易	飯班受朋友邀約到KTV唱歌，到場後發現還有很多不認識的人一起在包廂玩樂，上廁所時發現馬桶蓋上有不明粉末，請問下列作法，何者不恰當？		離開視線的飲料跟食物都不要再食用，餐具也要避免使用。	跟朋友講一聲，儘快藉故離開現場。	留下來把歌唱完，反正那是他們的事，不然付了4小的錢很浪費。	迅速傳遞訊息給其他朋友或老師等可靠的人，告知自己所在的地點及狀況，想辦法快離開。	C	離開視線的食物飲料最好都不要食用，且若發現疑似毒品的藥物，最好的方式是立即離開現場，如果實在無法離開就必須盡快傳訊息給可靠的朋友或師長，告知自己位置，尋求協助。	
84	中	關於毒品的危害，哪一項敘述較為正確？		只要不過量，毒品對於身體影響有限。	有部分醫療用藥物，與毒品成分相同，需經醫師處方才可使用。	新的改良毒品為了使人更能接受，因此對身體傷害低，成癮性也低。	可以用多種藥物代替單一藥物，對身體傷害較小。	B	即使不過量毒品還是會對身體造成嚴重影響，大部分的新興影響精神物質對身體傷害更嚴重，成癮性越高，使用越多藥物對身體傷害越嚴重。	
85	中	下列哪一人的說法是正確的？		小明：「多喝水，就可以讓腎臟把毒品完全排出體外。」	小光：「打排毒針，才可以把毒品完全排出體外。」	小新：「以毒攻毒，先吸安再拉K就戒不出來。」	小路：「頭皮或脂肪層，都可以找出來用藥過的痕跡。」	D	毒品檢驗方式有很多種，可以透過頭皮及毛髮驗出，且無論用任何方式，都無法抹除使用毒品的痕跡。	
86	中	下列哪些食品曾被摻入毒品販賣，因此要注意包裝有無問題？		巧克力、人參飲品	軟糖、仙道餅	即溶奶茶包	以上皆是	D	凡是包裝不完整，或是標示不全的食品皆有可能暗藏毒品。	
87	易	當功課或人際關係讓你感受沉重壓力時，下列哪一種做法無法減輕你的壓力？		找一個寧靜的空間靜坐，調息呼吸。	躺在椅子上，想像自己躺了一個舒適的空間，讓身心放鬆。	用大量安眠藥麻痹自己。	請家人陪伴到田野散步。	C	安眠藥會讓人成癮，過量使用也會造成中毒，甚至死亡。	
88	易	下列何者不是使用毒品的常見因素？		為了使人生更加豐富	有年長家人吸毒	好奇	不良同儕引誘	A	大部份青少年吸毒的原因包含家庭功能失調、心理情緒障礙、孤僻不善交友及同儕誘惑等，其中同儕誘惑是最主要的原因。	
89	易	林登參加朋友聚會，又吃又喝，又唱又跳後，下列哪種現象，表示林登被下藥了，應趕快離開現場？		視力模糊、影像扭曲。	無法控制的過度活動。	腦中湧現妄想、幻覺。	以上皆是。	D	染毒警訊有頭昏嘔吐、視力模糊、影像扭曲、無法控制的過度活動、妄想、幻覺、莫名焦慮及全身痠軟無力。	
90	難	請問下列關於成癮現象的名詞，何者說明錯誤？		耐受性是指用身體對藥物的抵抗力，耐受性高的人不會成癮。	心理依賴的現象有如對藥物的渴望，只有在用藥後才覺得生活美好。	生理依賴指需要用藥物來維持身體正常功能，不使用時會有戒斷症狀發生。	大部分慢性使用者會不斷地增加使用劑量，對藥物依賴與使用量逐漸增加的現象是「耐受性」。	A	耐受性則是指，當長期使用某種藥物一段時間後，身體對它的反應不像當初那麼敏感，因此需要增加劑量或更頻繁地使用藥物。	
91	難	屬於中樞神經抑制劑的藥物，不會對身體造成何種影響？		讓人興奮，手舞足蹈	抑制疼痛	抑制呼吸	使人鎮定	A	中樞神經抑制劑會作用在中樞神經系統，其作用主要是抑制大腦的心理運動活動，並解除緊張及焦慮，但當鎮靜劑在血中的濃度逐漸下降，使用者就會產生躁動、焦慮、抑鬱或沮喪等副作用。	

92	易	關於拒絕朋友邀約使用毒品的技巧的運用，何者敘述正確？		依照不同環境和狀況，可以使用不同的拒絕技巧拒絕朋友。	要使用堅定的態度和表情。	就算對方不接受，也必須以溫和的語氣堅持自己的態度	以上皆是	D	拒絕毒品的技巧有很多種，必須要善用每一個技巧，依據不同場合的狀況，選擇適當的技巧來使用。使用時配合堅定的表情，更能讓對方了解你堅定不使用毒品的立場。	
93	中	請問毒品危害防制中心所提供的24戒癮成功專線電話號碼為何？		0800-770-885	0800-636-363	0800-788-995	0800-085-717	A	法務部為整合全國各地方專防中心之諮詢電話，提供有需求之癮癮者及其家屬、朋友、一般民眾等便捷、迅速之電話求助管道，於98年3月4日成立0800-770-885（請請你，幫幫我）戒癮成功專線，作為全國一致、全年無休之24小時不打烊免付費求助專線。	
94	中	下列哪些選項為臺灣目前校園反毒措施？(1)警察定期至校園巡檢(2)若發現學生接觸毒品，立即成立專課小組(3)提供高關懷學生單一制式化的輔導方式(4)對特定族群實施戒斷		(1)(2)(3)(4)	(2)(3)(4)	(1)(2)(4)	(2)(4)	D	依據教育部「防制學生藥物濫用三級預防」實施計畫暨輔導作業流程，若學校發現學生有接觸毒品的可能性，會立即成立專課小組，對學生實行多元化輔導，並定期實施尿篩。	
95	難	戒煙節為幾月幾號？		6月3號	6月5號	6月26號	12月1號	A	6月5號為世界地球日；6月26為國際反毒日；12月1號為世界愛滋病日	
96	難	使用毒品後可以用何種方式檢驗？(1)血液檢測(2)唾液檢測(3)尿液檢測(4)毛髮檢測		(1)(2)(3)(4)	(1)(3)(4)	(1)(2)(4)	(1)(2)(3)	A	使用毒品後常用的檢測方式包括尿液檢測、唾液檢測、毛髮檢測及血液檢測。	
97	難	若尿檢測是否有施用毒品，檢測哪一個部位能追溯的時間最長？		血液	毛髮	尿液	唾液	B	毒品經人體代謝後殘留在毛髮，可保存數週至數年之久，因此可透過檢驗人體毛髮，歸結是否有施用毒品。	
98	難	何種藥品可能在服用後導致體溫過高？		惜他命	安非他命	搖頭丸	一粒眠	C	在服用搖頭丸之後，會導致體溫升高，甚至可高達43度，有青少年因服用過量搖頭丸而喪命。	
99	易	就讀高中的小方打算和朋友在畢業後一起出國玩，在機場時，有一個陌生人對他們說：「我行李太多了，能不能請你們幫我托運行李？」，此時小方該如何回應陌生人的要求最恰當？		拒絕對方的要求，並快離開	只答應他保管，並在地等候	答應幫他托運	以上皆非	A	販毒集團可能會利用同機的旅客幫他托運違禁品或毒品，已有案例因幫人托運內藏毒品行李而被判刑，所以在機場遇到類似情況，「拒絕」是最好的選擇。	
100	中	下列哪些政府部門有參與青少年藥物濫用防制？(1)法務部(2)教育部(3)衛生福利部(4)內政部警政署		(1)(2)(3)(4)	(1)(4)	(1)(2)(4)	(1)(3)(4)	A	臺灣藥物濫用防制體系主要由法務部、教育部、衛生部及內政部警政署等，一同推行。	
101	中	關於新興影響精神物質（New Psychoactive Substances, NPS）何者錯誤？		大多為化學合成藥物	使用者以年長者居多	種類繁多	常以新潮的包裝掩飾	B	自2009年至2016年，全世界共有739種NPS被報告到UNODC，NPS多以化學合成，方便其更改成分其製造。販毒也常將這些物質賦予新穎的名字、新潮的造型與包裝，使用者以年輕人居多。	

102	中	關於笑氣的敘述何者錯誤？		並不會致人於死	是一種麻醉劑	可用於工業原料	常被發現室用於俱樂部場所	A	笑氣是一種短效型吸入性全身麻醉劑，施用者多為在夜店或俱樂部的青少年。醫療上為與氧氣搭配使用，也用於工業加工原料之一。濃度過高的笑氣具有中毒危險，若吸食濃度過高的笑氣可能會造成休克，甚至猝死。	
103	易	小藍的父母不常在家，周圍的朋友又經常怂恿一起去夜店、網咖和參加遊玩，也會不時提供小藍不明的藥物使用，小藍也很容易相信朋友，導致小藍使用了毒品並染上了毒癮，請問小藍接觸毒品的因素有哪項？		心理因素	社會因素	家庭因素	以上皆是	D	心理因素包含是否容易相信他人及身心狀況是否健全等；家庭因素包含家庭管教、父母是否離異或有感情問題等；社會因素包括同儕環境是否容易取得毒品。	
104	易	當看到下圖時，身為偵探的哪一項解釋最正確？	JPEG_2	可能是有人在這使用鴉片或海洛因	附近的犯罪率可能較高	可能伴隨著愛滋病等傳染	以上皆是	D	鴉片及海洛因可用注射方式吸食，若共用針頭可能會有愛滋及傳染的風險。吸食毒品通常也伴隨著犯罪率的提升。	
105	易	舞會中，朋友拿出一些咖啡包，接著說：「吃這個可以讓你High，忘了煩惱。」、「只有一點點量，沒問題的。」、「你不敢嗎？」，如果你可以選擇以下哪一種方式可以幫助自己不受毒品危害？		轉移話題；說他感興趣的事	藉故離開；我有事先離開	自我嘲諷；我就是不敢喝	以上皆是	D	上述都是可用的拒絕方法，讓自己免於受到毒品威脅，還有其他的方式例如：堅持拒絕法；告訴對方你不使用、告知理由法；吸毒是傷害健康的事情...等，可依照當時情況自行選擇可以使用的�方法。	
106	中	哪一種新興毒品外表像白砂糖，施用者使用後容易頻尿，甚至需要膀胱重建？		安非他命	浴鹽	火狐狸	鴉片	D	長期使用鴉片會使膀胱纖維化，嚴重時需要膀胱重建手術進行改善。	
107	易	看完了《國際反毒日宣導影片》後，下列哪一種說法是錯誤的？		有家人、團隊成員的支持，可以幫助沮喪的人走出低潮陰霾。	吸毒是一種傷害身心健康的行為。	吸毒後能幫助自己走出迷惘。	認真讀書、認真運動、認真對待每一個當下，夢想就會自然發生。	C	毒品並不能幫自己走出迷惘，最好的方式還是建立健康的生活型態，更能加強自身心理健康。	https://www.youtube.com/watch?v=u1-9eVaK1NI
108	中	下列哪一種說法是錯誤的？		吸菸者會有更高的染毒機率。	販毒者會將毒品摻入自製的香菸。	外國進口菸品被列三級毒品。	新興毒品的成分大多不是天然的。	C	(A)研究指出有吸菸習慣的人有更低的風險接觸毒品，依據調查顯示被收容矯正機關的毒品成癮者，有高達91.6%都有吸菸習慣。(B)有些毒品販賣商將鴉片摻入香菸中偽裝(C)目前香菸並沒有被列為毒品，但依然有成癮風險。(D)新興影響神經物質幾乎都是化學合成的。	
109	難	哪一種毒品俗名白粉，毒性很強，許多國家已禁止用於醫療，容易上癮？		海洛因	嗎啡	安非他命	大麻	A	海洛因之毒性為嗎啡之10倍，且成癮性強，戒斷症狀甚強，許多國家皆已禁止醫療使用。	
110	易	使用毒品者有很多徵兆，但不包括哪種徵兆呢？		作息改變：一睡就是兩三天。	行為異常：莫名的揮霍東西。	情緒不穩：喜怒無常。	特殊癖好：喜歡栽種奇花異草。	D	特殊癖好並不是常見使用毒品者的徵兆。	
111	中	戒癮者使用口服美沙酮藥物以降低其對海洛因的渴望與避免痛苦的戒斷症狀，讓自己可維持原有的生活與工作，這是哪一類型的毒癮戒治模式？		宗教戒癮模式	藥癮治療模式	治療性社區模式	家族治療模式	B	藥癮治療模式：針對鴉片類藥物癮者個案使用口服美沙酮藥物或丁基酮啡因實施減害治療，降低使用對海洛因的渴望與避免痛苦的戒斷症狀，讓戒癮者可維持原有的生活與工作；另針對成癮個案提供心理社會治療、家族治療等模式。	

112	難	下列關於藥物成癮敘述何者錯誤？		是一種急性中毒	可能會因不斷取得藥物而傷害個人及社會	一個人可能會對一種以上的藥物產生依賴	行為上的特色是經常有強迫性的持續用藥	A	藥物濫用是一種慢性週期性的中毒。	
113	易	世界衛生組織將健康定義為生理、心理、社會等面向，若吸食毒品有可能傷害哪一個健康面向？		生理	心理	社會	以上皆是	D	毒品會造成身體傷害包括大腦、消化系統、免疫系統...等，間接對心理及社會健康造成影響，像是精神疾病及朋友關係疏離。	
114	難	關於毒品作用機制的敘述何者錯誤？		會刺激大腦產生大量多巴胺	多種毒品同時進入身體可能會產生交互作用	需要高劑量的毒品才會使人產生反應	長時間使用毒品，身體會對毒品敏感度會降低	C	少量毒品及會對人體產生影響，若吸食高劑量毒品可能會中毒，甚至是致命危險。	
115	中	大雄吃了朋友給的藥物後即昏睡了一整天，大雄所吃的藥物最有可能屬於哪一類？		興奮劑	抑制劑	迷幻劑	以上皆非	B	安眠藥品屬於抑制劑的一種，可引起嗜睡、注意力無法集中、神智恍惚及昏迷現象。	
116	中	小致受不了金錢誘惑，答應毒販幫他運毒，以坐飛機的方式將毒品運送到他國，而毒販在小致上飛機前，要求小致將大量毒品吞進體內運輸毒品，待吞食完畢後讓小致進入機場登機。下列哪個選項最不可能是在運輸毒品時的遭遇？		裝有毒品的塑膠袋破裂，大量毒品進入體內，使小致中毒死亡。	因身體不適送醫被發現體內藏有毒品。	因隨身攜帶毒品，造成誤傷，而無法進食。	因目前沒有儀器檢測得出小致有吞食毒品，而通關成功。	D	目前可利用人體X光機判斷在人體內是否藏有異物。	
117	難	生理上的毒癮大約多久可戒除？		10小時	10天	10週	10年	B	生理上的毒癮的戒除即可戒除，但心理上的毒癮可能一輩子都戒除不了。	
118	易	請問下列哪一項不屬於使用搖頭丸的行為特徵？		精神亢奮	對聲音感受變得敏感	增強記憶力	心跳加速、記憶力變差	C	搖頭丸屬於中樞神經興奮劑，會使施用者的精神亢奮，對聲音燈光較敏感，且會聞之搖擺起舞，但後這症是容易使記憶力變差、心跳加速、體溫過高，甚至脫水死亡。	
119	易	把某種物質放入塑膠袋裡吸食的行為可能會導致中毒且會喪失上進心，請問這可能在使用下列哪種非法藥物呢？		強力膠	嗎啡	FM2	鴉片	A	強力膠會揮發出高濃度的有機溶劑「甲苯」，是少數只能用吸食的方式攝入的毒品，使用者會覺得飄飄然，並會幻想出聲音及影像，容易對此產生心理依賴，且會損害吸食者的中樞神經與內臟器官，長期吸食者將可能導致各種慢性中毒，且有缺氧而死的機率。	
120	易	經常被搓成香菸的樣態，吸食後會造成平衡感喪失、記憶學習功能的障礙、對於影像、聲音的扭曲，常有毒販偽稱非法種植，請問是下列何種藥物？		FM2	古柯鹼	安非他命	大麻	D	大麻屬於中樞神經迷幻劑，長期使用會造成記憶、學習及認知能力減退，過量時甚至可能造成精神病，甚至死亡。大麻在台灣屬於第二級毒品，不能合法使用。	
121	中	有一種藥物是醫療用的短效麻醉劑，但因為吸入後很快就會產生愉悅感，因此常被青少年濫用、誤用，尤其是結合酒精、其他藥物時容易使青少年中毒，發生難以挽回的身心損害，請問他是下列哪種藥物呢？		乙醇	笑氣	喘喘	嗎啡	B	氧化亞氮，又稱笑氣，應用於牙醫的短效麻醉，但因為帶來欣快感，而被濫用，又使用者稱為吹氣球。使用方法是把該氣體灌在氣球中再吸入體內，也因為取得較一般毒品方便，因此常被拿來與其他毒品混用，但混用後的毒品致死率暴增，曾有新聞報導女學生因混用此藥物而猝死的案例。	

122	中	請問下列何者不是約會強暴藥物的性質呢？		多具有抑制中樞神經、安眠的效果，被害者通常會迅速失去意識	無色無味	有特殊香氣	經常被加在飲料中，使被害者不易察覺	C	約會強暴藥物多具有安眠藥或使人失憶的特性，加上其無色無味，被害者通常服用後難以自知，因此切莫再吃離開過自己視線的飲料食物。
123	難	液態快樂丸若服食，會讓你意識模糊、出現短暫失憶的現象，請問它的別名又稱為什麼呢？		紅中	冰塊	神仙水	白粉	C	神仙水又稱為液態快樂丸，因為它的功效與FM2（快樂丸）極相似，都會使被害者意識模糊、出現短暫失憶的現象，因此又稱為「約會強暴藥物」。
124	中	清朝末年赴則後燒掉中國的鴉片而成為6月3日禁煙節的由來，請問「鴉片」屬於哪一級的毒品呢？		第一級毒品	第二級毒品	第三級毒品	第四級毒品	A	鴉片與海洛因、嗎啡、古柯鹼並列第一級毒品。參考出處：108年反毒健康小學堂參考題庫-國小版題庫

是非題

編號	難度	題目	多媒體檔名	答案	詳解	詳解多媒體檔名
1	中	長期施用毒品會產生對毒品的耐受性，因此毒品對身心健康的影響會越來越小。		錯誤	耐受性是指長期使用某些藥物後，身體內對藥物反應產生改變，如果只使用原來的劑量，無法達到原來使用的效果，為了達到和前一次相同的結果，便需要增加劑量，導致劑量使用逐漸增加，對身心產生更大的危害。	
2	中	安非他命是中樞神經興奮劑，而價值命(K他命)是中樞神經抑制劑，因此兩種毒品一起使用就驗不出來了。		錯誤	安非他命和價值命(K他命)兩者作用無法產生中和反應，因此兩種毒品都會被驗出來。	
3	中	初次使用安非他命會感到無力、沮喪、心情低落等狀態，在多次使用後，則會感到有提神、振奮的效果。		錯誤	安非他命是中樞神經興奮劑，初次使用安非他命會感到有提神、振奮的效果，然而多次使用或藥性消退後，前述的感覺會逐漸縮短或消失，不時感到無力、沮喪、心情低落等狀態。	
4	中	根據毒品危害防制條例規定，製造、運輸、販賣毒品者的刑責比轉讓、持有毒品者重。		正確	根據毒品危害防制條例第四條規定：「製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣二千萬元以下罰金。」，比較第八條規定：「轉讓第一級毒品者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金。」及第十一條規定：「持有第一級毒品者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣五萬元以下罰金。」	
5	易	施用毒品後，只要多喝水、牛奶，或使用排毒針，將身體內的毒排出體外，就不會被驗出來了。		錯誤	檢驗的方式除了透過尿液，尚包含毛髮、血液、脂肪層等方式，這些地方都會殘留服用過藥的代謝成分，排毒針其實就是綜合維他命以及大量的點滴(生理食鹽水)，除了尿液量增加，有助於排尿外，在體內仍會殘留著用過藥的成分。	
6	中	可以透過使用安非他命的方式，有效的提神振精神或減肥。		錯誤	初次使用安非他命會感到有提神、振奮的效果，然而多次使用後，前述的感覺會逐漸縮短或消失，反而會不經感到無力、沮喪、心情低落等狀態，使用安非他命作為減肥的方式，會產生副作用，如：妄想型的精神分裂症，症狀包括猜忌、妄想、視幻覺、聽幻覺、強迫或重複性的行為、睡眠障礙等。	
7	中	東東基於友情幫從事販賣毒品的朋友把風，因為只是把風，並未加入販賣的過程中，所以不違反毒品危害防制條例。		錯誤	無論是把風、聯繫、收款等，只要是和販賣毒品有關的行為，都是毒品危害防制條例所規定的販毒共犯，因此會違反毒品危害防制條例。	
8	易	到KTV幫同學慶生的時候，可以使用毒品營造更加快樂的氣氛。		錯誤	營造快樂的氣氛可以透過真誠、幽默遊戲、唱歌等方式，而不需要透過毒品，使用毒品不只違法，更會傷害身心的健康，並無法達到快樂的目的。	
9	中	毒品和管制藥品的區別在於是不是醫學或科學上需要使用的合法藥品？		正確	符合醫療及科學上使用的合法藥品為管制藥品，否則即為毒品。大部分毒品及管制藥品的類別，品項都是相同的。	
10	難	吸食強力膠和笑氣(氧化亞氮)同樣會被依《毒品危害防制條例》處罰。		錯誤	吸食強力膠和笑氣(氧化亞氮)後，雖然會出現和吸食毒品類似的症狀，但是目前他們並沒有被規定在《毒品危害防制條例》的處罰對象裡面，目前只能以《社會秩序維護法》處罰。	
11	易	吸食毒品除了損害自己的身體健康、耗費大量金錢、導致人際關係疏離之外，還會造成社會治安的問題。		正確	吸食毒品除了危害自己的身體外，也會對自己與家人的關係造成不好的影響，甚至導致社會整體治安變差，百害而無一利。	

12	易	雖然使用毒品得到的快感是一時的，但只要持續使用就可以讓我永遠遠離現實生活的問題。		錯誤	使用毒品可以讓你短暫的忘記現實的問題，但是一旦其效過了，便會發現原本存在的問題還是沒有解決，毒品只是讓人暫時從現實逃避而已。	
13	中	當一個原本喜歡打電動的人，自從開始吸食毒品之後便對電動遊戲興趣缺缺，只想著要做什麼事情才能滿足自己對毒品的渴望，這種時候我們便可以說他毒品成癮了。		正確	依照國際疾病分類，要判斷「成癮症候群」的一種症狀即為：使用藥物之後因為要花更多時間去取得或使用藥物，而對其他娛樂逐漸失去興趣。	
14	易	如果父母有使用毒品的狀況，可能會讓小孩覺得吸吸沒有什麼大不了，進而有樣學樣。		正確	父母親的言教及身教對於成長期的小孩來說非常重要，小孩會觀察父母親的所作所為加以模仿、學習，因此如果父母親有使用毒品的狀況，將會大大提升小孩也跟著吸吸的機率。	
15	中	懷孕時有吸毒行為的婦女容易生下發育不完全或是有缺陷的小嬰兒，主因是因為他們把錢都拿去買毒品而無法定期產檢。		錯誤	婦女在懷孕期間有吸毒行為的話，藥物成分會被體內的胎兒吸收，導致生出來的嬰兒發育不完全，沒有進行產檢只是無法提前知道胎兒有缺陷，因此這不是導致嬰兒有缺陷的主因。	
16	易	毒品的本質其實是具有成癮性的物質或藥物，我們之所以把它稱為毒品是為了讓人們產生排斥、恐懼的反應，以達到拒絕毒品的效果。		正確	毒品真正的危害在人們不了解它的用處、用法、對身體可能造成的後遺症時便衝動使用而產生，從反面來看如果遵守用法並且不濫用使用，其中一些物質反而可以在醫療領域上對我們產生幫助，並非他們本身真的有害，但是需要特別注意的是，這些物質仍然是需要經過醫生的指示使用才是安全的！	
17	中	透過一些看起來特別驚動的標語或恐怖影片來進行反毒宣導，將可以讓所有的民眾遠離毒品。		錯誤	目前我們的做法便是傾向讓民眾對「毒品」兩字產生恐懼、厭惡，並且藉由人們會遠離自己害怕或討厭的事物的特性來進行反毒政策的推動，但是使用毒品的危害不一定立刻顯現，因此這樣的作法對身邊有使用過毒品經驗的人來說，可能反而會讓他們產生懷疑（如：身邊的人使用了一次毒品並沒有產生特別嚴重的後果，反毒的宣導是不是過度誇大了），因而造成反效果。	
18	難	葡萄牙原本是歐洲有名的毒品氾濫的國家，但在他們的政府把毒品除罪化之後，毒品的吸食率便顯著的下降了，因此只要在我國把毒品除罪化，就可以解決目前毒品氾濫的情況。		錯誤	毒品除罪化必須搭配許多配套措施才能產生正面效果，例如：要如何幫助那些使用毒品的人...，雖然別國的成功的經驗值得我們參考，但沒有參考我國現實情況直接把整套制度移植過來也不一定能夠達到理想的效果。	
19	中	從大範圍的角度來看，毒品氾濫會導致一個國家的勞動力減少，進而導致國家競爭力下降。		正確	毒品上癮的人嚴重的話會影響到他的日常生活，導致其無法上學或工作，進而無法從事對社會有幫助的活動，由此可知如果一個國家的政府忽略毒品氾濫的嚴重性而未好好防治，將會導致一個國家的競爭力下降。	
20	中	使用毒品的人可能受到毒品作用的影响而變得情緒不穩，甚至產生有攻擊性的暴力行為，因此成為社會上治安的隱憂。		正確	長期使用毒品會造成人的性情改變，在一些毒品的作用下也可能產生妄想或幻覺，甚至造成精神疾病，這兩種原因都可能造成吸食毒品的人產生攻擊或犯罪行為。	
21	中	毒品會引發的犯罪類型有很多，其中包括販賣毒品後的金錢分配不均或是黑吃黑，毒品交易買賣者間也會起衝突甚至引發殺機。		正確	許多毒品的價格高昂因此被視為賺錢的工具，因此也有很多案件是雙方約好了一筆毒品買賣，到了當場其中一方為了拿到更多的錢而殺害另外一方（可以同時得到毒品和金錢）的情況。	
22	難	在使用毒品的過程中，和別人共用針頭的行為很有可能導致感染B型肝炎。		正確	這種狀況是發生在原本使用針頭的人是B型肝炎的帶菌者之下，由於B型肝炎是透過血液或體液傳染，使用過的針頭上面的血液會含有病毒，在利用這個針頭注射毒品的時候也會把病毒注射進自己身體裡。	
23	中	成績很好或是家庭環境很好的人因為沒有需要擔心的事，所以不會有濫用毒品的問題。		錯誤	這是對使用毒品的人的刻板印象，但其實使用毒品的原因有很多，可能一時好奇、被朋友引誘、為了保持成績壓力大或是家庭關係疏離...等，因此並不是外表看起來光鮮亮麗或家境好的人就不會有濫用毒品的問題。	
24	易	萬一家中小孩發生濫用毒品的狀況，可能導致家庭氣氛不和睦、常常爭吵甚至家人關係破裂。		正確	一旦家中有人使用毒品便會對家庭氣氛造成很大的影響，尤其使用毒品的人是小孩的話，家長間容易互相爭執甚至管教不當，另外吸食毒品需要龐大的金錢支援，在金錢的壓力下，小孩也可能和家長為了要錢而反目成仇。	
25	難	有些毒品的使用方式需要針筒注射，因此在經常共用針頭的狀況下，一些透過血液和體液傳染的疾病便會爆發傳染，這也是推動美沙酮替代療法減毒計畫的背後原因之一。		正確	從前因為警察會在警局附近埋伏，趁使用毒品者前來購買針筒時逮捕他們，後來他們知道便不會冒險到警局購買乾淨的針筒，因此共用針頭的情況更為普遍，進一步也造成愛滋病、B型肝炎的傳染率提升，後來引進的美沙酮替代療法，由於是以口服方式使用，不需針筒注射，可以減少病毒傳染，又因為減毒計畫，因此改變了這些疾病傳染的情況。	
26	中	使用鴉片類藥物成癮的患者，可能會導致提早衰老或是失智症的狀況。	https://www.youtube.com/watch?v=gwSPN0E2Q-Q	正確	如影片所示，這類患者體內某種細胞激素的濃度比正常人高，而這種細胞激素會影響細胞新生及認知功能，因此導致早衰或失智症。常見的鴉片類藥物有：嗎啡、可待因、海洛因...等。	
27	易	就算曾經濫用過毒品導致成癮，只要對未來的生活有了目標和理想，堅定意志，就比較能夠拒絕毒品再次誘惑。	https://www.youtube.com/watch?v=48&v=Zzy0uSagY0	正確	每個人在生活中多多少少都會碰到不如意的事情，尤其在困中的時候可能會覺得自己為什麼要急著去得這麼辛苦，或是找不到未來的方向，但是只要多方嘗試就能找到熱愛東西和未來的目標，一旦有了理想，堅定去追求目標，便比較不會再受毒品的誘惑了。	
28	易	對剛從監獄出來想戒毒的人來說，其中一個困難便是沒有辦法脫離以前的朋友圈。		正確	剛從監獄出來的人通常需要一段時間才能夠再度適應社會的生活，在這段適應的這段時間因為身邊沒有可以理解他的人，因此很容易和以前的壞朋友再度聯繫在一起，而影響到戒毒的決心和行動。	

29	中	如果你是老闆，面對前來應徵但是有吸食毒品前科的人，應該用維護公司內部風氣的理由拒絕他的求職。		錯誤	有吸食毒品前科的人，的確曾經做了不好的事，但是他們既然有心出來找工作就代表有心想要重新過正常的生活。因此，社會上的老闆們及大眾也應該盡自己的力量幫助他們，就算只是一份工作，對他們來說都是格外珍貴的機會，可以幫助他們重新站起來。	
30	中	在我國的吸毒人口中，青少年佔了百分之五十的比例。		錯誤	根據刑事警察局的發布資料，從102年度到106年度間，青少年被查獲的吸毒人口，大部分都落在國內查獲毒品人口的15.26%到17.31%之間。	
31	難	曾經使用過毒品的人就算戒除毒癮，由於心理成癮的關係，在日常生活中只要接觸到任何可以讓他們想起之前吸毒經驗的人、事、物，都會很容易再犯。		正確	毒品成癮有兩個部分，分別是生理和心理，透過戒癮治療戒除的只是生理上的癮，如果沒有親友支持或是足夠的意志力，堅持過著乾淨及正常的生活，心理的癮很容易會再發作，便可能會再次被毒品所吸引。	
32	易	許多青少年為了尋求認同感而加入幫派，隨著認識的人越來越多，自信心也跟著提升，而為了讓自己也被幫派的人認同於是跟著吸毒甚至販毒，這就是他們接觸毒品的第一步。	https://www.youtube.com/watch?v=YcWmG14vVA&list=PLwF9UuYvOXPyHESYzRCzWg7n10mmfWgYz&index=10&list=0s	正確	青少年在成長期容易面臨自我認同和情緒感的危機，同時也會因為叛逆期而與家人有較多摩擦，因此在這個時期外界同儕對青少年的影響特別大，跟家人相處不好的青少年很容易脫離家庭而跟外面的朋友混在一起，有許多人就會為了得到朋友的認同而在愚昧之下使用毒品。	
33	中	科技的進步使得警方的查獲手段變得更多元，也讓民眾可以更快更便捷的接觸到毒品的資訊，因此對於解決毒品氾濫的問題只有正面的效果。		錯誤	科技的進步雖然便利於民眾認識更多關於毒品的危害，但同時也有心人士很容易就能接觸到購買毒品的管道，製造毒品的方法...等，因此科技進步對於解決毒品氾濫的問題來說，同時具有正面和負面的效果。	
34	易	遇到朋友找你一起吸食毒品應該拒絕他，堅持做對的事情而不盲目從眾。		正確	儘管朋友很重要，但吸食毒品會對自己的身體造成傷害，也會讓親友傷心，因此應該要自己仔細思考是非對錯之後，用嚴肅的態度拒絕對方。	https://www.youtube.com/watch?v=CJyvd4mkmk&list=PLwF9UuYvOXPyHESYzRCzWg7n10mmfWgYz&index=23
35	中	有抽菸和喝酒或是吃慣懶習慣的人，比起其他人更容易接觸到毒品，甚至進而使用它。		正確	這可能是因為平常有抽菸等習慣的少年會出入的場所、認識的人比一般少年來的複雜，也可能是因為這群少年已經習慣用這種方式來逃避生活中所面臨的壓力或挫折，因此習慣使用一切可以暫時讓自己從現實逃避的物質，但這並不代表所有有這些習慣的人最後都會使用毒品。	
36	中	政府如此重視青少年濫用毒品的問題是因為，通常越早開始使用毒品的人，他的犯罪生涯（一輩子中從事犯罪的時間）也會越長。		正確	曾經使用毒品的人，出獄之後會再度因為毒品相關犯罪而再次被抓進監獄的人佔絕大多數，如果一個年輕人從十五歲開始使用毒品，可能往後的三、四十年他都會在監獄裡進進出出，幾乎等於白費了整個人生，因此政府才會大力在校園推動反毒，希望能從小就建立大眾關於毒品正確的觀念。	
37	難	當古柯鹼和酒精同時使用時會產生交互作用，但不至於嚴重到導致死亡。		錯誤	當吸食者使用這兩項物質的時間很接近時，身體會將古柯鹼轉化成另外一種毒性更高的化學物質，因此古柯鹼和酒精的混用是藥物死亡最常見的原因之一。	
38	中	如果發現住家周圍的住宅時常傳出刺鼻的化學性氣味，有可能是隱藏在民宅的製毒工廠，應迅速通報警方。		正確	許多製毒工廠為了躲避警方查緝，時常隱藏在住宅區中，製毒的人往往沒有正確的化學概念，容易發生爆炸、火災等意外，製毒所產生的毒氣和廢棄物也會影響附近居民的健康，若有發現時常散發化學性氣味的民宅，應該通報警方，請警方處理，不要自己擅自進入，以免遇到危險。	
39	易	許多新興毒品常包裝成咖啡包、餅乾、糖果的型態。		正確	教育部「毒品？糖果？讓你秒懂毒品的偽裝術」。	https://reurl.cc/DGxE5
40	中	毒品施用者因共用針具的行為，較容易得到愛滋病、B型肝炎及C型肝炎等傳染性疾病。		正確	共用針具（包含針頭及針筒）的行為，容易經由血液或體液傳染愛滋病、B型肝炎及C型肝炎等傳染性疾病。	
41	中	若依處方箋使用安眠藥一段時間後，失眠的情況已經改善，可以自行停藥。		錯誤	停藥需要和醫師討論，並採取逐步減少劑量的方式，避免因自行停藥，而出現戒斷症狀或反彈性失眠（失眠的情形比吃藥前更嚴重）。	
42	中	將許多毒品混合後，會感到更快樂。		錯誤	混和毒品會因為毒品的特性不同，導致更高的毒性，使身體承受更嚴重的害。	
43	難	戒毒時，生理上的癮比心理上的癮還要難戒。		錯誤	生理上的癮通常會在兩週內即可戒除，但心理上的癮很難從癮癮者之記憶中根除，癮癮者通常會回憶起吸毒時的愉快感，這也是復發的主要原因。	
44	難	濫用藥物後，只要數天內不繼續使用，是不會被檢測出來的。		錯誤	藥物會殘留在身體的各個部位，毛髮、頭皮、尿液及血液，只需要透過特定的方式，即使是很少的殘留量都測得出來。	

45	難	信他命是國高中階段青少年濫用度最高的藥物之一，對青少年族群危害最為嚴重。		正確	依據107年藥物濫用案件暨檢驗統計資料顯示，19歲以下通報案例，用藥種類以信他命佔第一位(45.6%)，第二位為安非他命(42.1%)。	
46	男	在KTV所看到不明包裝或拆裝痕跡的軟糖及咖啡包皆有可能摻雜毒品。		正確	依據新北市警察局新型毒品趨勢分析，近期所查獲的混型毒品種類眾多，包含膠囊、果凍、仙彈餅、巧克力、軟糖及咖啡包等。	https://www.youtube.com/watch?v=zRDY6_Q0BAE
47	中	某些歐洲國家推行施用毒品除罪化，其目的是讓癮癮者更願意面對毒癮問題，尋求醫療協助，並不是鼓勵吸癮。		正確	某些國家推行施用毒品除罪化，其用意是為了降低癮癮者為了取得毒品而犯罪、控制濫用藥物價格及供應，也試圖透過此政策鼓勵癮癮者就醫治療。	
48	中	雖然目前還有許多新興影響精神物質(New Psychoactive Substances, NPS)，對青少年族群造成嚴重健康問題，但各國已在積極解決，也研擬出許多新的防制方法。		正確	新興毒品種類繁多，其原因在於這些毒品能輕易地透過不同的化學合成方式，改變其原有化學結構，躲避監管單位之查緝，但目前各國已重視此問題，並已著手研擬相關法規。	
49	中	毒品市價非常昂貴，其原因是因為製造過程繁複，且原料價格昂貴。		錯誤	毒品價格高並非毒品本身製造成本高，而是因販賣者可能會面臨刑罰上的風險並且想藉此獲取暴利，故抬高市場價格。	
50	男	安眠藥是一般常見的藥品，任意使用並不會成癮。		錯誤	安眠藥大多具成癮性，若使用不當亦會對身心造成危害，且此類藥物為管制藥品，若無醫師開立處方，不可使用。	
51	男	吸癮是自己的事，只要不危害到他人，其他負擔都可以由自己承擔。		錯誤	吸癮常衍生出其他的問題，包括犯罪率的提升、家庭功能失調、精神疾病...等。有些問題並不是吸癮者能夠控制的。	
52	難	新興型態毒品的茶包，因摻雜在奶粉中稀釋，所以對身體的影響較低。		錯誤	現今新興毒品奶茶包當中所驗出的毒品種類眾多，曾有單一咖啡包驗出十餘種毒品，通常成癮性也較單一藥物高，且藥物混用對於身體傷害加劇。	
53	難	長期使用大麻會造成注意力、記憶力、判斷力下降。		正確	長期使用大麻會成癮，並會造成注意力、記憶力、判斷力下降、無方向感、意識混亂、人格喪失、幻覺和幻覺等。	
54	中	共用針頭的毒品使用者有較高的風險感染愛滋病及C型肝炎。		正確	成癮者共用針頭是傳播是傳播愛滋病、B型肝炎及C型肝炎的原因，若其針頭沾有患者的血液，極有可能因此感染染毒的使用者。	
55	男	培養健康的心理狀態，建立友誼的同儕關係是遠離毒品的方式之一。		正確	青少年時期，良好的心理狀態、家庭關係、同儕關係和社會環境都能保護青少年不去使用毒品。	
56	中	使用毒品會造成身心的傷害，但並不會使人死亡。		錯誤	毒品不僅會造成身心危害，若不慎使用過量容易導致中毒死亡。國內已有許多案例，因吸癮過量而喪命。	
57	中	癮癮者很可能隨著時間，增加用量和使用效果更強的藥物。		正確	因生理機制會慢慢適應原有藥物的刺激，因此需要更強的藥物才能滿足用癮者的癮癮。大多數的癮癮者都因此越陷越深，無法自拔。	
58	男	生活環境對青少年的影響很大，若同儕、家人使用毒品和社區環境有毒品供給，都有可能是影響青少年毒品使用的重要因素。		正確	通常在青少年吸癮的個案其生活環境都較為複雜和伴隨著家庭問題，所認識的朋友也多半在使用毒品，因此應主動避免自己陷入毒品危機，若遇到困難也可尋求協助。	
59	中	國中階段的青少年並沒有吸癮的案例，都是三、四十歲的成癮者在吸癮，所以不必擔心朋友會給你毒品。		錯誤	每年都有國中階段的青少年吸癮被通報的案例，因此不要輕忽毒品威脅，隨時提高警覺。	
60	男	使用毒品能幫助青少年增加注意力和專注力，提升學習效能。		錯誤	經過研究使用毒品的青少年，多半會造成記憶力衰退和生活作息不正常等問題，也會造成青少年課業成績退步，學習效能低落。	
61	難	長期使用毒品會讓身體越來越衰弱，但只要下定決心戒癮就可以完全恢復到原本的狀態。		錯誤	長期使用毒品可能會損害大腦認知功能、精神狀態和生理器官，像吸食大麻可能引發肺病及憂鬱症、搖頭丸會造成腦部病變及肝部損傷、信他命造成膀胱纖維化...等。有些都是不可逆的傷害，即便戒除生理上的癮癮，但這些已經對身體造成的傷害是會伴隨癮癮者一輩子的。	
62	中	戒除毒癮是一個漫長的過程，不僅要面對的是戒除毒癮的戒斷症狀和不適，更需長期和心癮對抗。		正確	目前臺灣癮癮者再犯率高達七成，其需要戒除的不僅是生理上的依賴，而是心理上的依賴，需要透過他人長期陪伴及重建生活型態，這個過程是非常漫長且痛苦的。	

63	難	因為大麻的危害性低於菸菸，所以很多國家都開放使用了。	錯誤	大麻和香菸一樣會使人成癮，且目前已有越來越多研究指出大麻會對生理造成嚴重影響，其包含引發肺癆、憂鬱症、記憶力衰退、降低免疫力及影響生殖能力，聯合國也將其列為最高等級管制藥品。僅有部分國家考量其國內複雜的狀況而部分有條件的開放，並非因其危害低。	
64	易	如果朋友都在使用毒品了，我還不用就是代表我不夠勇敢。	錯誤	證明自己勇敢的方式有很多，使用毒品並不能證明自己多勇敢。	
65	中	為了避免接觸毒品，青少年知道越少的毒品資訊越好。	錯誤	依據研究顯示具有較完善藥物濫用知識的青少年，更能抗拒毒品的誘惑，越有把握能拒絕毒品的誘惑。	
66	中	吸菸、喝酒和嚼檳榔的青少年有較高的可能性使用成癮藥物。	正確	菸、酒是人門級的成癮藥物，依據調查顯示被收容進矯正機關的毒品成癮者，有高達91.6%都有吸菸習慣，且根據調查，青少年吸菸，同時有菸、酒不良行為的比例約為30.4%，遠大於非吸菸者的4.3%，而常嚼檳榔者，吸菸風險是不吸菸者的4.2倍。	
67	難	青少年時期因身體健壯，因此毒品對青少年的危害較低。	錯誤	毒品無論在哪一個年齡使用都會對身體造成嚴重的影響，且越早成癮對身體的傷害越大。	
68	難	FM2又稱十字架、強效藥丸，常被用於強姦犯罪的工具。	正確	FM2的原名為羅西西洋(Rohypnol)Flunitrazepam，又稱強姦藥丸、十字架、鈞索強丸等，透過注射及口服的方式進入體內，具心理及生理依賴性，為強力安眠藥，迅速誘導睡眠，因此常被當作強姦犯的犯罪工具，加在飲料中，給被害者服用。	
69	中	如果遇到嚴重的心理創傷，最好對外尋求幫助，不將情緒堆積在心中，或使用毒品麻醉自己。	正確	毒品並不能幫助解決問題，只會讓人越陷越深。	
70	中	冒險治療是協助青少年戒毒的方法之一，主要目的是分散青少年對毒品的注意力，幫助青少年重建新的生活型態。	正確	冒險治療是想透過冒險活動分散青少年對毒品的依賴，建立新的生活型態，遠離毒品，常見的包括：登山活動、單車環島、健行...等。	
71	中	有些毒品是不會讓人成癮的。	錯誤	毒品主要作用的部位都是大腦，透過化學物和腦中的受體結合，使人產生依賴，所以不要相信有不會成癮的毒品。	
72	易	加入幫派和經常出入複雜的場所可能使青少年不知不覺的接觸到毒品。	正確	研究指出，加入幫派、經常出入KTV、網咖、舞廳等場所之青少年，越有可能使用毒品。	
73	易	如果在學校無法獲得成就感，還是可以透過其他的方式獲取榮譽，不需要靠吸菸或參與幫派活動證明自己很厲害。	正確	培養自己的長處、專長，並從中獲得成就感才是證明自己最好的方式。	
74	易	若未經醫師允許使用麻醉藥品，可能會成癮，並對身體造成傷害。	正確	醫療用麻醉藥品有嗎啡、可待因、鴉片、丁基原啡因...等成分，皆具有成癮性。	
75	難	「聰明藥」能幫助學生快速地學習，是尚未被管制的藥物，因此常被使用在學生身上。	錯誤	「聰明藥」的是一種叫做派派甲鹽(Methylphenidate)的藥品，派派甲鹽用於治療「注意力缺陷過動症(Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 簡稱ADHD)」，也就是我們俗稱的「過動症」，「聰明藥」為第三級管制藥品，具成癮性，屬於中樞神經興奮劑，其並無法增加學生成績，使用後副作用包括幻覺、震盪、食慾不振、噁心、視力模糊、心悸、心律不整等。	
76	難	目前臺灣醫療戒癮模式的訴求，是將癮者視為病人，不僅過關立藥方，亦企圖透過行為改變技術，改變癮者的生活模式，以較全面的方式治療癮者。	正確	醫療模式是一種把使用毒品者當作病人來醫治，照顧的戒癮模式，這種醫療模式，認為吸食毒品導致健康上的困擾，是生病的一種，把吸菸者當作病人來治療是合情合理的事，而醫療機構的責任，是開立藥方，以及配合提供各種方法來照顧病人，解決病人的問題，是臺灣目前使用的戒癮模式之一。	
77	易	藥頭時常在毒品參雜麵粉及太白粉，增加毒品重量，牟取暴利。	正確	藥頭會為了降低成本而在毒品中摻雜麵粉、太白粉、糖粉、鹽...等，從中獲取暴利，詐取財物。	
78	易	毒品製造的品質並不穩定，濃度差異大，很可能不慎使用過量而中毒。	正確	製毒工廠通常設備較簡陋，因此所製造的毒品品質差異大，不同批毒品濃度可相差數十倍，若不慎使用到過高劑量的毒品，可能因此中毒，甚至喪命。	
79	易	「預防勝於治療」，意味著預防青少年接觸毒品是重要的防制藥物濫用策略之一。	正確	依據三級預防架構原則，預防勝於治療，目前在國中學習課程中也融入許多藥物教育和相關防制措施，增加學生自身的保護力及降低危險因子。	

80	難	目前並無醫院附設專門的癮癮戒治門診。		錯誤	目前有百餘個衛生福利部指定的醫療院所提供癮癮及酒癮的戒治門診，提供癮癮者替代藥物、戒治服務...等，讓癮癮及癮癮者有醫療求助的管道。	
81	難	笑氣是一種興奮劑。		錯誤	笑氣又稱一氧化二氮，是一種效型的吸入性全身麻醉劑。	
82	難	重度吸食強力膠者，可能會導致其智商下降。		正確	甲苯是常見的強力膠成份，也是毒性的來源，長期接觸甲苯者會導致腦部白質損傷，會顯得容易衝動，並傷害其認知功能，造成智商下降，記憶障礙及注意力不集中。	
83	難	吸癮者可能會有傷害他人的傾向。		正確	當藥物作用於大腦時會影響腦部的運作，造成幻覺及降低判斷力，因此有些吸癮者會有傷害他人的傾向。	
84	難	聯合國毒品和犯罪問題辦公室將新興影響精神物質定義為：未於1961年與1971年國際禁藥管制協定中列管，對社會與健康具有危害性的物質都屬新興影響精神物質。		正確	聯合國毒品與犯罪辦公室(UNODC)將沒有被1961年「麻藥品單一公約」及1971年「精神藥物公約」所列管藥物稱之為「新興影響精神物質」(New Psychoactive Substances, NPS)	
85	易	用針頭吸食毒品可能會因反覆刺傷皮膚使得皮膚潰爛。		正確	有案例因使用針頭吸食毒品，反覆刺傷皮膚，而使得皮膚變得脆弱，受到細菌感染而潰爛。	
86	難	將吸癮者全關到監獄是處理藥物濫用問題最好的方式。		錯誤	關在監獄的癮癮者出來後復發率極高，原因是因為出獄後的癮癮者沒有一技之長，又和社會脫離而無法抗拒毒品的誘惑，所以目前的處理方式是希望透過宗教、培養一技之長和提供醫療等方式，幫助癮癮者抗拒毒品的誘惑。	
87	中	若在公園撿到一根捲曲狀菸頭的香煙，有可能是毒品。	JPEG_1	正確	吸食者會將毒品放入香煙中，再將包好的香菸捲起。	
88	中	在醫院所戒癮，是將吸癮者關在小房間等到癮癮消退即可戒除癮癮，有生命危險才加以治療。		錯誤	醫院院所會提供毒品的替代藥物及精神治療，給予戒癮者信心，過程是非常漫長的，並不是單純將癮癮者關在小房間就好。	
89	難	鼻中隔穿孔可能是因為吸食他命。		正確	有些癮癮者吸食毒品會因血管收縮出現鼻中隔穿孔症狀。	
90	中	若飲料被加入FM2是可以喝得出藥物的味道的。		錯誤	FM2溶於飲料中無色無味，因此常被有心人士拿來當作加害、侵犯他人的工具。	
91	易	大多數人的意志力並不能抗拒毒品的誘惑。		正確	毒品會上人上癮是因為藥物會作用在大腦，使人產生幻覺或欣快感，而這種機制會使人依賴藥物，導致生理及心理上成癮。根據統計有7-8成吸癮的人都很難克制自己的慾望，即便戒癮後，依然會選擇繼續使用毒品。	
92	中	吸癮可以增加男性性功能。		錯誤	吸癮並無法增加性功能，只會傷害身體導致身體虛弱。	
93	易	新聞中出現一位吸癮者，因傷口受到細菌感染而大面積潰爛，然而吸癮者卻毫無感覺，是因為毒品會和神經受體結合，釋放令大腦產生愉悅感的物質。		正確	毒品分子進入血液後會和神經受體結合，佔據神經受體，不斷地刺激神經釋放神經傳導物質，讓大腦產生幻覺及愉悅感。	
94	中	用針頭注射吸癮可能會使皮膚產生傷口，但重度吸食者在癮癮發作時只會想立即滿足癮癮，所以會選擇用注射方式可直接將藥物帶到血液中。		正確	注射毒品進身體的方式會讓人產生傷口，甚至引發細菌感染，但重度癮癮者在癮癮發作時並不會顧慮那麼多，只想趕快將毒品注射進體內緩解癮癮，這種方式雖然快速但對身體的傷害並不小。	
95	中	會吸癮的人都是低教育程度的。		錯誤	依據衛福部105年度藥物濫用案件暨檢驗統計資料指出，吸癮者背景也包括擁有大學或研究所學歷者。	
96	易	毒品對身體的傷害，不單單是腦部，而是全身性的		正確	毒品對身體的傷害是全身性的，國外研究指出，濫用藥物可能造成心血管系統、免疫系統、造血系統、肝臟解毒功能等異常，且身心靈都會受影響，像認知功能、生活動機等，除了使工作能力降低，學業退步，產生情緒上的障礙外，若在課業上適應不良，也會導致失學或是輟學，在人際關係的各個面向上，無論家庭內、外、學校、工作都有可能造成負面的影響。	

97	易	當吸毒者突然停止或減少使用毒品時，生理上就會出現不舒服的反應，這種現象叫做「戒斷」反應。		正確	當突然停止或減少使用毒品時，生理上就會出現不舒服的反應，這種現象叫做「戒斷」反應；因為害怕這種不舒服的感覺，就會繼續再使用，而且用量會越來越多，甚至到一種近乎中毒的情況。為了要得到毒品，可能無法工作與讀書，進而衍生經濟上的問題，身體上也會出現很多毛病，甚至可能為了買毒品而去犯罪。當產生這些狀態的時候，就已經是陷入「成癮」的泥沼之中。	
98	中	在癮癮戒治方面，若有家庭大力的支持與陪伴，得到的治療效果較佳。		正確	衛生福利部臺南療養院成癮暨司法精神科開始進行信他命的戒癮治療，目前治療效果較佳的案例，大多有較強的家族力量支持，只要父母願意多花時間與心思在孩子的陪伴上，越年輕的孩子，越容易回到正軌。	
99	難	吸食成癮性較高的毒品者，可以使用替代療法來輔助戒除癮癮。		正確	「美沙酮」本身也具有成癮性，但他可作為海洛因的替代藥物，幫助癮癮者戒癮。	
100	難	若發現學生使用毒品，學校應立即成立響應小組，主要目的是輔導學生遠離毒品。		正確	根據三級預防流程，校方之響應小組，目的是推行學校反毒策略及輔導學生。	
101	易	反毒政策中「減少供應、減少需求」是指減少毒品的供給量並降低使用毒品者的數量。		正確	國際間防制藥物濫用及毒品管制政策，幾乎均以「減少供應」(Supply Reduction)、「減少需求」(Demand Reduction)及「減少傷害」(Harm Reduction)政策為主要策略方針。減少供給指的是減少毒品在市面上的供給量；減少需求則是指藉由提供戒毒管道，降低毒品使用人口。	
102	中	冰島政府所實施得青少年戒癮政策，對防制青少年毒品使用並無幫助。		錯誤	冰島政府為了解決青少年使用毒品問題提出幾項措施，包含實施宵禁、鼓勵社團運動及增加家庭互動，而該方式大幅的降低了青少年毒品使用率。	
103	易	對於青少年吸癮問題，長期追蹤輔導是非常重要的。		正確	目前各縣市都會交換資訊，追蹤用毒的青少年，並加以輔導，避免學生在接觸到毒品。	
104	難	吸食者周圍有濃濃的白煙以及塑膠的惡臭味，由此可以判斷這位施用者可能在抽含有信他命的菸。		正確	換信他命會發出像燒塑膠般的惡臭味。	